傅青主女科







傅青主女科

同治八年湖北
崇文書局開雕

青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯寃事尋得白當時義聲動天下馬文甫義士傳比之裴瑜魏邵國變後隱居崛嵋山中四方仰望丰采己未鴻詞之薦先生堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傅山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣中書聽其回籍蓋其高尚之志已久為

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已細哉字為六藝之一先生固嘗究心君醫者先生所以晦迹而逃名者也而名即隨之抑可奇矣且夫醫亦何可易言自後漢張仲景搨立方書以來幾二千年專門

名家罕有窮其奧者先生以餘事及之遽通乎神余讀兼濟堂文集並觚賸諸書記先生軼事其診疾也微而臧其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生旣擅高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著女科並産後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙酉適世兄王奎章來省試具道李子緝中賢至丙戌冬果寄貲命付剞劂甚盛德事也故樂爲序而行之並述先生生平大節及

聖朝廣大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月

仍崖張鳳翔題

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如拆舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何爲而刻乎此書爲傅青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手即愈此書則不然其方專爲女科而設其症則爲婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人

雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論逞一己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫徹靈素能收十全之效者不數數覯讀徵君此書談症不落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨症詳明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晋省鈔本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇症翻檢照方煎服必能立起沉疴並登壽

域或亦濟人利世之一端也夫

道光十一年新正上元同里後學邢爾誠謹序

明生員傅先生山傳　　　　提督學政嵇曾筠撰

傅先生名山字青主一字公他陽曲人祖霖官山東遼海參議父之謨明經授徒號離垢先生山生而穎異讀書十行并下過目輒能成誦年十四督學文太青拔入庠繼文者袁臨侯先生繼咸也一見深器之進食餼檄取讀書三立書院時時以道學相期許山益發憤下帷袁每云山文誠佳恨未脫山林氣耳崇禎丙子繼咸爲直指張孫振誣詆下獄山徒步走千里外伏闕訟冤孫振怒大索山山微衣藍縷轉徙自匿百折不回繼咸冤得白當是時山義聲聞天下後繼咸官南方數召山山終不往　國朝定鼎自九江執繼咸北上山乃潛入都省候繼咸起居繼咸見殺山收其遺藁而歸山性至孝

父之謨病篤朝夕稽顙於神廟以身代旬日父愈人謂孝通神明不異黔婁云執親喪哀毀特甚苫塊米飲不茹蔬果友愛諸季先人遺産弟蕩費强半終身無怨色弟殁撫遺孤過於己子失偶時年二十七子眉甫五齡旁無妾媵誓不復娶於里黨婣戚竭力賙其緩急爲人分別有讓恭儉下人與人言依於忠孝謀事要於誠實蓋其敦厚彝倫根本自然非有强也自李自成犯京師明莊烈皇帝殉國山遂絕意進取束青衿爲黃冠號石道人擇衣草履時遨遊於平定祁汾間所至有墨痕筆跡工詩賦善古文詞臨池得二王神理該博古今典籍百家諸子靡不淹貫大叩大鳴小叩小鳴復自託繪事寫意曲盡其妙精岐黃術邃於脈理而時通以儒義不

拘拘於叔和丹溪之言踵門求醫者戶常滿貴賤一視之家故饒至是漸益窶妾貧樂道泊如也屋舍田園多為細人竊據槩置不問康熙戊午 詔舉博學宏詞廷臣交章薦山山堅以老病辭當事者立迫就道道稱疾病不能行有司舁入都臥旅邸不赴試滿漢王公九卿賢士大夫下逮馬醫夏畦市井細民莫不重山行義就見者羅溢其門子眉送迎常不及山但敧倚榻上言衰老不可為禮諸貴人益以此重山弗之怪也明年三月吏部驗病入告奉 旨傅山文學素著念其年邁特授內閣中書著地方官存問遣得放歸歸愈澹泊自甘僻居遠郡不入城府然欽其名者益眾率紆道往見冀得一面為榮又六年卒遠近會葬者數千百人山所著有

性史十三經字辰周易偶釋周禮音辨條春秋人名韻
地名韻兩漢人名韻等書
稽禮齋曰昔者嘗怪先生値堯舜之世篤志高尚懇辭
徵辟何其果也及讀漢史見周黨王霸之爲人初不辱
於新莽建武復辟連徵不起乃知士各有志先生蓋有
道而隱者也彼誠見夫有明末季上下交征利卒滅亡
於寇盜之手固已心寄夫長林豐草矣寧復以青紫爲
榮耶至若義白知己之冤其賢於世之平居師友相親
暱臨難背負不一引手救援然若不相識者亦遠矣古
云民生於三事之如一惟其所在則致死焉先生眞無
愧哉
贊曰於惟先生得聖之清訟冤奔訃蒙難不驚辭榮卻

聊先民是程功在名教百世景行

鐵城寄傅青主附札二首 附錄霜紅龕集　宜春袁繼咸 袁山

獨子同憂患于今乃別離乾坤留古道生死見心知貫械還餘草傳燈不以詩悠悠千載業努力慰相思

江州求死不得至今只得爲其從容者聞黃冠入山養母甚善甚善此時不可一步口口也有詩一冊付曲沃錫瑤屬至門下藏之山中矣可到未乙酉冬季

前詩到未若未到門下不可往取可屬西河曹孝廉緩頰取之必藏之門下所日今若經觀史觀二書經觀籍就矣史觀倘未竟不知能終竟此業否晉士惟門下知我甚深不遠蓋棺斷不敢負門下之知使異日益稱袁繼咸爲友生也丙寅秋朔

徵君傅山傳　附錄池北偶談　濟南王士禛貽上著

徵君傅山字青主一字公佗太原府人母夢老比邱而生生復不啼一瞽僧至門云既來何必不啼乃啼六歲食黃精不樂穀食強之乃復食讀十三經諸子史如宿通若巢顛十年袁臨侯繼咸督學山西爲巡按御史張孫振誣劾被逮山[illegible]偕左右伏闕上書白其冤論德爲君常世奇作山右二義士傳謂山與汾陽薛宗周比之裴瑜魏劭亂後夢天帝賜黃冠衲衣遂爲道士裝醫術入神有司以醫見則見不然不見也康熙戊午徵聘至京師以老病辭己未與范陽杜樾俱授內閣中書舍人歸里山工八分隸及金石篆刻畫入逸品子眉字壽毛亦工畫作古賦數十篇常鬻藥四方兒子共挽車暮抵逆

旅輒篝燈課讀經史騷賦選諸書詰旦成誦乃行否則

與杖

女科上卷目錄 凡三十八條三十九症四十一方

帶下

婦科一門最爲難治不難於用方難於辨症也五帶症辨之極明立方極善倘用之不效者必其人經水

女科上卷

陽曲傅 山青主手著

白帶下 一

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脉不能約束而有此病故以名之蓋帶脉通於任督任督病而帶脉始病帶脉者所以約束胞胎之系也帶脉無力則難以提繫必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然而帶脉之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水而反變爲帶病矣故病帶者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室女則少也況加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人

不調須於調經種子二門參酌治之無不見效即如白帶症但服藥不效其人必經水過少則少腹急迫宜服寬帶湯餘宜類參方見三十三

有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以為經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白朮一兩土炒　山藥一兩炒　人參二錢　白芍五錢酒炒
車前子三錢酒炒　蒼朮三錢製　甘草一錢　陳皮五分
黑芥穗五分　柴胡六分

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開

提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之强則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

青帶下二

婦人有帶下而色青者甚則綠如綠豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木木色屬青帶下流如綠豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成青帶之症不知水爲肝木之所喜而濕實肝木之所惡以濕爲土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩

脾土喜燥而惡濕土病濕則木必乘之木又爲濕土之氣所侮故肝亦病逍遥散減去當歸妙極

扶邪元邪四字未淅

相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脉遂從陰器而出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓五錢　白芍五錢酒炒　甘草五錢生用　柴胡一錢　茵陳三錢　陳皮一錢　梔子三錢炒

水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱也鬱則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱

礙易以黃水眞火爲濕熱之氣所侵繞於任脉云云較黃帶病終原書究不可輒改姑仍之

按丹元指本體而言淫熱卽水火不正之氣所以爲邪合成者如淨銀傾入鉛鏑便不成正色矣眞水眞火與邪濕合爲一則

肝氣得淸而靑綠之帶又何自來此方之所以奇而效捷也倘僅以利濕淸熱治靑帶而置肝氣於不問安有止帶之日哉

黃帶下三

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汁其氣腥穢所謂黃帶是也夫黃帶乃任脉之濕熱也任脉本不能容水濕氣安得而入而化爲黃帶乎不知帶脉橫生通於任脉任脉直上走於脣齒脣齒之間原有不斷之泉下貫於任脉以化精使任脉無熱氣之繞則口中之津液盡化爲精以入於腎矣惟有熱邪存於下焦之間則津液不能化精而反化濕也夫濕者土之氣實水之侵熱者火之氣實木之生水色本黑火色本紅今濕與熱合欲

不但侵夾所以色變原書原無註病

凡帶症多係脾濕初病無熱但補脾土兼理衝任之氣其病自愈若濕久生熱必得淸腎火而濕始有去路方用黃柏車前子妙山藥芡實尤能淸熱生津

化紅而不能欲返黑而不得煎熬成汁因變爲黃色矣此乃不從水火之化而從濕化也所以世之人有以黃帶爲脾之濕熱單去治脾而不得痊者是不知真水真火合成丹邪元邪繞於任脈胞胎之間而化此黅色也單治脾何能痊乎法宜補任脈之虛而淸腎火之炎則庶幾矣方用易黃湯

山藥一兩炒　芡實一兩炒　黃柏二錢鹽水炒　車前子一錢酒炒

白果十枚碎

水煎連服四劑無不全愈此不特治黃帶方也凡有帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋山藥芡實專補任脈之虛又能利水加白果引入任脈之中更爲便捷所以奏功之速也至於用黃柏淸腎中

之火也腎與任脈相通以相濟解腎中之火即解任脈之熱矣

黑帶下 四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅何以成黑謂爲下寒之極或有之殊不知火極似水乃假象也其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以涼水少覺寬快此胃火太旺與命門膀胱三焦之火合而熬煎所以熬乾而變爲炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之症不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成

病愈後當節飲食戒辛熱之物調養脾土若恃有此方病發輒服必傷元氣矣愼之

黑帶之症是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火爲主火熱退而濕自除矣方用利火湯

大黃三錢 白朮五錢土炒 茯苓三錢 車前子三錢酒炒 王不留行三錢 黃連三錢 梔子三錢炒 知母二錢 石膏五錢煅 劉寄奴三錢

水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑帶變爲白三劑白亦少減再三劑全愈矣或謂此方過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法譬如救火之焚而少爲遷緩則火勢延燃不盡不止今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品入於大黃之中則迅速掃除而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急則濕與熱俱無停住之機佐白朮以輔土茯苓以滲濕車前以

利水則火退水進便成既濟之卦矣

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者似血非血淋瀝不斷所謂赤帶也夫赤帶亦濕病濕是土之氣宜見黃白之色今不見黃白而見赤者火熱故也火色赤故帶下亦赤耳惟是帶脉繫於腰臍之間近乎至陰之地不宜有火而今見火症豈其路通於命門而命門之火出而燒之耶不知帶脉通於腎而腎氣通於肝婦人憂思傷脾又加鬱怒傷肝於是肝經之鬱火內熾下尅脾土脾土不能運化致濕熱之氣蘊於帶脉之間而肝不藏血亦滲於帶脉之內皆由脾氣受傷運化無力濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以似血非血之形象現於其色也其實血與

不用參朮[illegible]
[illegible]反見[illegible]於年逾四九癸水將止或類頻見血此崩症也宜分別治之

五帶症古方極多然應有不[illegible]總是[illegible]病[illegible]湯[illegible]

濕不能兩分世人以赤帶屬之心火誤矣治法須清肝火而扶脾氣則庶幾可愈方用清肝止淋湯

白芍醋炒一兩　當歸酒洗一兩　生地酒炒五錢　阿膠麵炒三錢　白粉丹皮三錢　黃柏二錢　牛膝二錢　香附酒炒一錢　紅棗十個　小黑豆一兩

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑不再發此方但主補肝之血全不利脾之濕者以赤帶之爲病火重而濕輕也夫火之所以旺者由於血之衰補血即足以制火且水與血合而成赤帶之症竟不能辨其是濕非濕則濕亦盡化而爲血矣所以治血則濕亦除又何必利濕之多事哉此方之妙妙在純於治血少加清火之味故奏功獨奇倘一利其濕反

病原故用無不效

若血崩數日血下數斗六脈俱無鼻中微微有息不可遽服此方恐氣將脫不能受峻補也有

引火下行轉難遽效矣或問曰先生前言助其脾土之氣今但補其肝木之血何也不知用芍藥以平肝則肝氣得舒肝氣舒自不克土脾不受剋則脾土自旺是平肝正所以扶脾耳又何必加人參白朮之品以致累事哉

血崩昏暗 六

婦人有一時血崩兩目黑暗昏暈在地不省人事者人莫不謂火盛動血也然此火非實火乃虛火耳世人一見血崩往往用止濇之品雖亦能取效於一時但不用補陰之藥則虛火易於冲擊恐隨止隨發以致經年累月不能全愈者有之是止崩之藥不可獨用必須於補陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

力者用遼人參三五錢煎成沖貫衆炭末一錢服之待氣息微旺然後服此方乃加貫衆炭末一錢無不見效無力者用無灰黃酒沖貫衆炭末三錢服之待其氣接神清始可服此方人參以黨參代之臨服亦用貫衆灰末一錢沖入

大熟地九蒸一兩　白朮炒焦一兩土　黃芪生用三錢　當歸酒洗五錢

黑姜二錢　人參三錢

水煎服一劑崩止十劑不再發倘畏藥味之重而減半則力薄而不能止方妙在全不去止血而惟補血又不止補血而更補氣非惟補氣而更補火蓋血崩而至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣以爲護持若不急補其氣以生血而先補其血而遺氣則有形之血恐不能遽生而無形之氣必且至盡散此所以不先補血而先補氣也然單補氣則血又不易生單補血而不補火則血又必凝滯而不能隨氣而速生況黑薑引血歸經是補中又有收斂之妙所以同補氣補血之藥並用之耳

亦有孀婦年老血崩者必係氣沖血室原方加杭芍炭三錢貫衆炭三錢神效

年老血崩七

婦人有年老血崩者其症亦與前血崩昏暗者同人以爲老婦之虛耳誰知是不愼房幃之故乎夫婦人至五十歲之外天癸匱乏之原宜閉關守寨不宜出陣戰爭苟或適興不過草草了事尚不至腎火大動倘興酣浪戰亦如少年之好合鮮不血室大開崩決而墜矣方用加減當歸補血湯

當歸一兩酒洗 黃耆一兩生用 三七根末三錢 桑葉十四片

水煎服二劑而血少止四劑不再發然必須斷慾始除根若再犯色慾未有不重病者也夫補血湯乃氣血兩補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉者所以滋腎之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精旣虧

妊娠宜避房事不過者繼卒不平崩往往隨胎即不墮胎生子亦難養慎之戒之

用此方以止其暫時之漏實有奇功而不可責其永崩之續者以補精之味尚少也服此四劑後再曾加

白朮五錢　熟地一兩　山藥四錢　麥冬三錢

北五味一錢

服百劑則崩漏之根可盡除矣

少婦血崩　八

有少婦甫娠三月即便血崩而胎亦隨墮人以為挫閃受傷而致誰知是行房不慎之過哉夫少婦行房亦事之常耳何便血崩蓋因元氣衰弱事難兩顧一經行房洩精則妊娠無所依養遂致崩而且墮凡婦人之氣衰即不耐久戰若貪歡久戰則必洩精太甚氣每不能攝夫血矣況氣弱而又娠再加以久戰內外之氣皆動而

血又何能固哉其崩而墮也亦無怪其然也治法自當以補氣為主而少佐以補血之品斯為得之方用固氣湯

人參一兩 白朮五錢土炒 大熟地五錢九蒸 當歸三錢酒洗
白茯苓二錢 甘草一錢 杜仲三錢炒黑 山萸肉二錢蒸
遠志一錢去心 五味子十粒炒

水煎服一劑而血止連服十劑全愈此方固氣而兼補血已去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡氣虛而崩漏者此方最可通治非僅治小產之崩其最妙者不去止血而止血之味含於補氣之中也

交感血出九

婦人有一交合則流血不止者雖不至於血崩之甚而

欲種子者必待落紅後卽三十時辰兩日半也經來之時數足三十時辰後可入房一日男二日女三日男四日女五日男六日女七日男過七日卽不能受孕矣

終年累月不得愈未免血氣兩傷久則恐有血枯經閉之憂此等之病成於經水正來之時貪歡交合精冲血管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈何以久而流紅不知血管最嬌嫩斷不可以精傷凡婦人受孕必於血管已淨之時方保無虞倘經水正旺彼欲涌出而精射之則欲出之血反退而縮入既不能受精而成胎胞胎之氣引舊日之集精外出而益之以補氣補精之勢必至集精而化血交感之際淫氣觸動其舊日之精則兩相感召舊精欲出而血亦隨之而出治法須通其竅則血管之傷可以補完矣方用引精止血湯

人參五錢 白朮一兩土炒 茯苓三錢去皮 熟地一兩九蒸

山萸肉五錢蒸 黑薑一錢 黃栢五分 芥穗三錢

車前子二錢炒

水煎連服四劑愈十劑不再發此方用參朮以補氣用熟地萸以補精精氣既旺則血管流通加入茯苓車前以利水與竅水利則血管亦利又加黃柏爲引直入血管之中而引夙精出於血管之外芥穗引敗血出於血管之內黑薑以止血管之口一方之中實有調停曲折之妙故能袪舊病而除陳痾然必須愼房幃三月破者始不至重傷而補者始不至重損否則不過取目前之效耳其愼之哉宜寡慾

鬱結血崩十

婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐吞酸而血下崩者人皆以火治之時而效時而不效其故何也是不識爲肝

此方入貫仲炭三錢更妙

氣之鬱結也夫肝主藏血氣結而血亦結何以反至崩漏蓋肝之性急氣結則其急更甚更急則血不能藏故崩不免也治法宜以開鬱爲主若徒開其鬱而不知平肝則肝氣大開肝火更熾而血亦不能止矣方用平肝開鬱止血湯

白芍一兩醋炒　白朮一兩土炒　當歸一兩酒洗　丹皮三錢
三七根三錢研末　生地三錢酒炒　甘草二錢　黑芥穗二錢
柴胡一錢

水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除四劑血崩愈方中妙在白芍之平肝柴胡之開鬱白朮利腰臍則血無積住之虞荊芥通經絡則血有歸還之樂丹皮又清骨髓之熱生地復清臟腑之炎當歸三七於補血之

中以行止血之法自然鬱結散而血崩止矣

閃跌血崩十一

婦人有升高墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者若以崩治非徒無益而又害之也蓋此症之狀必手按之而疼痛久之則面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比倘不知解瘀而用補澁則瘀血內攻疼無止時反致新血不得生舊血無由化死不能悟豈不可傷哉治法須行血以去瘀活血以止疼則血自止而愈矣方用逐瘀止血湯

生地一兩酒炒　大黃三錢　赤芍三錢　丹皮一錢

當歸尾五錢　枳殼五錢炒　龜版三錢醋炙　桃仁十粒炮炒研

水煎服一劑疼輕二劑疼止三劑血亦全止不必再

足跌打損傷吸伸血喉痛皆宜如此治法初血聚胃中宜加川厚樸一錢小薑汁炒

凡血崩症致宜絕慾避房經禁少年人彼此貪歡故服藥往往不效若三月後崩止疾愈而房

服矣此方之妙妙於活血之中佐以下滯之品故逐瘀如掃而止血如神或疑跌閃升墜是由外而傷內雖不比內傷之重而既已血崩則內之所傷亦不爲輕何以只治其瘀而不顧氣也殊不知跌閃升墜非由內傷以及外傷者可比蓋本實不撥去其標病可耳故曰急則治其標

血海太熱血崩十二

婦人有每行人道經水卽來一如血崩人以爲胞胎有傷觸之以動其血也誰知是子宮血海因太熱而不固乎夫子宮卽在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海者衝脈也衝脈太寒而血卽虧衝脈太熱而血卽沸血崩之爲病正衝脈之太熱也然旣由衝脈之熱則應常

虚仍[illegible]制病必[illegible]作久則戒勞慎之

崩而無有止時何以行人道而始來果與肝木無恙耶夫脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房之時君相二火寂然不動雖衝脈獨熱而血亦不至外馳及有人道之感則子宮大開君相火動以熱招熱同氣相求翕然齊動以鼓其精房血海泛濫有不能止遏之勢肝欲藏之而不能脾欲攝之而不得故經水隨交感而至若有聲應之捷是惟火之爲病也治法必須滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半載而除矣然必絕慾三月而後可方用清海丸

大熟地一斤九蒸　山萸十兩蒸　山藥十兩炒　丹皮十兩

北五味二兩炒　麥冬肉十兩　白朮一斤土炒　白芍一斤酒炒

龍骨二兩　地骨皮十兩　乾桑葉一斤　元參一斤

沙參十兩 石斛十兩

右十四味各爲細末合一處煉蜜丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方補陰而無浮動之虞縮血而無寒涼之苦日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼而血海自固倘不揣其本而齊其末徒以髮灰白礬黃連炭五棓子等藥末以外治其幽隱之處山恐愈澁而愈流終必至於敗亡也可不慎與

婦人鬼胎

婦人有腹似懷妊終年不產甚至二三年不生者此鬼胎也其人必面色黃瘦肌膚消削腹大如斗厥所由來必素與鬼交或入神廟而興雲雨之思或遊山林而起

鬼祟之事儒者弗道然城市鄉曲往往有是症不可不察甚勿以此言爲荒唐也

交感之念皆能召祟成胎幸其人不至淫蕩見祟而有驚惶遇合而生愧惡則鬼祟不能久戀一交媾即遠去然淫妖之氣已結於腹遂成鬼胎其先尚未覺迨後漸漸腹大經水不行內外相色一如懷胎之狀有似血臓之形其實是鬼胎而非臓也治法必須以逐穢爲主然人至懷胎數年不產即非鬼胎亦必氣血衰微況此非眞妊則邪氣必旺正不敵邪其虛弱之狀必有可掬烏可純用迅利之藥以祛蕩乎必於補中逐之爲的也方

天師新傳紅花霹靂散 紅花半斤 大黃五兩 雷丸三兩 水煎服亦能下胎然未免太於迅利過傷氣血不若蕩鬼湯之有益無損爲愈也在人臨症時斟酌而善用之耳

用蕩鬼湯

人參一兩 當歸一兩 大黃一兩 雷丸三錢

川牛膝三錢 紅花三錢 丹皮三錢 枳殼一錢

厚樸一錢 小桃仁三十粒

水煎服一劑腹必大鳴可瀉惡物半桶再服一劑又瀉惡物而愈矣斷不可復用三劑也蓋雖補中用逐未免迅利多用恐傷損元氣此方用雷丸以祛穢又得大黃之掃除且佐以厚樸紅花桃仁等味皆善行善攻之品何邪之敢能留腹中而不盡逐下也哉尤妙在用參歸以補氣血則邪去而正不傷若單用雷丸大黃以迅下之必有氣脫血崩之患矣倘或知是鬼胎如室女寡婦輩邪氣雖盛而真氣未漓可用峻天師方亦宜斟酌也

共研細末開水爲丸如桐子大空心開水下服後半日時煎平胃散一劑服之蒼朮炒加二錢 小腹脹加 橘皮 枳實 加 當歸 川芎 服後必下惡物若不下

室女鬼胎十四

女子有在家未嫁月經忽斷腹大如妊面色乍赤乍白六脈乍大乍小人以爲血結經閉也誰知是靈鬼憑身乎夫人之身正則諸邪不敢侵其身不正則諸邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而對面相狎或假托親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其始則驚詫爲奇遇而不肯告人其後則羞赧爲淫褻而不敢告人日久年深腹大如斗有如懷妊之狀一身之精血僅足以供腹中之邪則邪日旺而正日衰勢必至經閉而血枯後雖欲導其經而邪據其腹則經亦難通欲生其血而邪食其精則血實難長醫以爲胎而實非眞胎又以爲瘕而亦非瘕病往往因循等待非因羞憤

見下惡物次日再服平胃散不用桂香此方陰降大炎見有因此病素情而歸於非命勞瘵而喪於妙年深爲可惆若服此方不應平服桂香平胃散無不見效愈後宜調養氣血節飲食肉桂去粗皮一錢木香一錢以十二味

而亡其生即成勞瘵而終不起至死不悟不重可悲哉治法似宜補正以祛邪然邪不先祛補正亦無益也必須先祛邪而後補正斯爲得之方用蕩邪散

雷丸六錢　桃仁六十粒　當歸一兩　丹皮一兩　甘草四錢

水煎服一劑必下惡物半桶再服調正湯治之

白朮五錢　蒼朮五錢　茯苓三錢　陳皮一錢　貝母一錢

薏米五錢

水煎連服四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣前方蕩邪後方補正實有次第或疑身懷鬼胎必大傷其血所以經閉今既墜其鬼胎矣自當大補其血乃不補血而反補胃氣何故蓋鬼胎中人其正氣大虛可知氣虛則血必不能驟生欲補血必先補氣是補氣

婦科調經尤難蓋經調則無病不調則百病叢生治法宜詳察其病原細審其所以不調之故然後用藥始能見效此書雖有先期後期先後無定之症分然[illegible]

血自然生也用二术以補胃陽陽氣旺則陰氣難犯尤善後之妙法也倘重用補陰之品則以陰招陰吾恐鬼胎雖下而鬼氣未必不再侵故必以補陽爲上策而血自隨氣而生也

調經　經水先期　十五

婦人有先期經來者其經甚多人以爲血熱之極也誰知是腎中水火太旺乎夫火太旺則血熱水太旺則血多此有餘之病非不足之症也似宜不藥有喜但過於有餘則子宮太熱亦難受孕更恐有爍乾男精之慮過者損之謂非旣濟之道乎然而火不可任其有餘而水斷不可使之不足治之法但少清其熱不必洩其水也

方用清經散

丹皮三錢 地骨皮五錢 白芍酒炒三錢 太熟地九蒸三錢
青蒿二錢 白茯苓一錢 黄柏五分鹽水浸炒

水煎服二劑而火自平此方雖是清火之品然仍是滋水之味火洩而水不與俱洩損而益也

又有先期經來只一二點者人以為血熱之極也誰知腎中火旺而陰水虧乎夫同是先期之來何以分虛實之異蓋婦人之經最難調苟不分别細微用藥鮮克有效先期者火氣之冲多寡者水氣之驗故先期而來多者火熱而水有餘也先期而來少者火熱而水不足也倘一見先期之來俱以為有餘之熱但洩火而不補水或水火兩洩之有不更增其病者乎治之法不必洩火只專補水水既足而火自消矣亦既濟之道也方用兩

地湯

大生地一兩酒炒　元參一兩　白芍藥五錢酒炒　麥冬肉五錢

地骨皮三錢　阿膠三錢

水煎服四劑而經調矣此方之用地骨生地能清骨中之熱骨中之熱由於腎經之熱清其骨髓則腎氣自清而又不損傷胃氣此治之巧也況所用諸藥又純是補水之味水盛而火自平理也此條與上條參觀斷無誤治先期之病矣

經水後期十六

婦人有經水後期而來多者人以爲血虛之病也誰知非血虛乎蓋後期之多少實有不同不可執一而論蓋後期而來少血寒而不足後期而來多血寒而有餘夫

經本於腎而其流五臟六腑之血皆歸之故經來而諸經之血盡來附益以經水行而門啟不遑迅闔諸經之血乘其隙而皆出也但血既出矣則成不足治法宜於補中溫散之不得曰後期者俱不足也方用溫經攝血湯

大熟地一兩九蒸　白芍一兩酒炒　川芎五錢酒洗　白朮五錢土炒

柴胡五分　五味子三分　肉桂五分去粗研　續斷一錢

水煎服三劑而經調矣此方大補肝腎脾之精與血加肉桂以祛其寒柴胡以解其鬱是補中有散而散不耗氣補中有洩而洩不損陰所以補之有益而溫之收功此調經之妙藥也而攝血之仙丹也凡經來後期者俱可用倘元氣不足加人參一二錢亦可

以上調經三條辨論明五立方微妙但恐臨時或有外感內傷不能見效有外感者宜加蘇葉一錢有內傷者宜加神曲二錢炒有因肉食積滯者再加東山楂肉二錢炒臨症須酌

經水先後無定期 十七

婦人有經來斷續或前或後無定期人以為氣血之虛也誰知是肝氣之鬱結乎夫經水出諸腎而肝為腎之子肝鬱則腎亦鬱矣腎鬱而氣必不宣前後之或斷或續正腎之或通或閉耳或曰肝氣鬱而腎氣不應未必至於如此殊不知子母關切子病而母必有顧復之情肝鬱而腎不無繾綣之誼肝氣之或開或閉即腎氣之或去或留相因而致又何疑焉治法宜舒肝之鬱即開腎之鬱也肝腎之鬱既開而經水自有一定之期矣方用定經湯

菟絲子一兩酒炒 白芍一兩酒炒 當歸一兩酒洗 大熟地五錢九蒸

山藥五錢炒 白茯苓三錢 芥穗二錢炒黑 柴胡五分

用之若肝氣鬱甚又當以逍遙散為主有熱加梔炭丹皮即加味逍遙散

曾見婦人一年一行終身健無

水煎服二劑而經水淨四劑而經期定矣此方舒肝腎之氣非通經之藥也補肝腎之精非利水之品也肝腎之氣舒而精通肝腎之精旺而水利不治之治正妙於治也

經水數月一行十八

婦人有數月一行經者每以為常亦無或先或後之異亦無或多或少之殊人莫不以為異而不知非異也蓋無病之人氣血兩不虧損耳夫氣血既不虧損何以數月而一行經也婦人之中亦有天生仙骨者經水必一季一行蓋以季為數而不以月為盈虛也真氣內藏則坎中之真陽不損倘加以煉形之法一年之內便易飛騰無如世人不知是經水不應月來誤認為病妄用藥

[illegible]後……行經……月經不……擇育男皆……成人錢以……爲……成亦……仙骨之所……較……亦遺……化食入不……則耶

固本無病而治之成病是治反不如其不治也山間貰人之教特爲闡揚使世人見此等行經不必妄行治療萬勿疑爲氣血之不足而輕一試也雖然天生仙骨之婦人世間不少而嗜慾損天之人亦復甚多又不可不立一療救之方以輔之方名助仙丹

白茯苓五錢　陳皮五錢　白朮土炒三錢　白芍酒炒三錢　山藥炒三錢　菟絲子酒炒二錢　杜仲炒黑一錢　甘草一錢

河水煎服四劑而仍如其舊不可再服也此方平補之中實有妙理健脾益腎而不滯解鬱清痰而不洩不損天然之氣血便是調經之大法何得用他藥以冀通經哉

年老經水復行十九

加貫仲炭一錢研細末以藥汁服尤妙

婦人有年五十外或六七十歲忽然行經者或下紫血塊或如紅血淋人或謂老婦行經是還少之象誰知是血崩之漸乎夫婦人至七七之外天癸已竭又不服濟陰補陽之藥如何能精滿化經一如少婦然經不宜行而行者乃肝不藏脾不統之故也非精過洩而動命門之火即氣鬱甚而發龍雷之炎二火交發而血乃奔矣有似行經而實非經也此等之症非大補肝脾之氣與血而血安能驟止方用安老湯

人參一兩　黃芪生用一兩　大熟地九蒸一兩　白朮五錢土炒

當歸五錢酒洗　山萸五錢蒸　阿膠一錢蛤粉炒　黑芥穗一錢

甘草一錢　香附五分酒炒　木耳炭一錢

水煎服一劑減二劑尤減四劑全減十劑愈此方補

益肝脾之氣氣足自能生血而攝血尤妙大補腎水水足而肝氣自舒肝舒而脾自得養肝藏之而脾統之又安有泄漏者又何慮其血崩哉

經水忽來忽斷時疼時止二十

婦人有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者人以爲血之凝也誰知是肝氣不舒乎夫肝屬木而藏血最惡風寒婦人當行經之際腠理大開適逢風之吹寒之襲則肝氣爲之閉塞而經水之道路亦隨之而俱閉由是腠理經絡各皆不宣而寒熱之作由是而起其氣行於陽分則生熱其氣行於陰分則生寒然此猶感之輕者也倘外感之風寒更甚則內應之熱氣益深往往有熱入血室而變爲如狂之症一似遇鬼之狀者若但往來

加荊芥穗炒黑一錢尤妙

寒熱是風寒未甚而熱未深耳治法宜補肝中之血通其鬱而散其風則病隨手而效所謂治風先治血血和風自滅此其一也方用加味四物湯

大熟地一兩九蒸　白芍五錢酒炒　當歸五錢酒洗　川芎三錢酒洗

白朮五錢土炒　粉丹皮三錢　元胡一錢酒炒　甘草一錢

柴胡一錢

水煎服此方用四物以滋脾胃之陰血用柴胡白芍丹皮以宣肝經之風鬱用甘草白朮元胡以利腰臍而和腹疼入於表裏之間通乎經絡之內用之得宜自奏功如響也

經水未來腹先疼二十一

婦人有經前腹疼數日而後經水行者其經來多是紫黑

黑塊人以爲寒極而然也誰知是熱極而火不化乎夫肝屬木其中有火舒則通暢鬱則不揚經欲行而肝不應則抑拂其氣而疼生然經滿則不能內藏而肝中之鬱火焚燒內逼經出則其火亦因之而怒洩其紫黑者水火兩戰之象也其成塊者火煎成形之狀也經失其爲經者正鬱火內奪其權耳治法似宜大洩肝中之火然洩肝之火而不解肝之鬱則熱之標可去而熱之本未除也其何能益方用宣鬱通經湯

白芍五錢酒炒　當歸五錢酒洗　丹皮五錢　山梔子三錢炒

白芥子二錢炒研　柴胡一錢　香附一錢酒炒　川鬱金一錢醋炒

黃芩一錢酒炒　生甘草一錢

水煎連服四劑下月斷不先腹疼而後行經矣此方

補肝之血而解肝之鬱利肝之氣而降肝之火所以奏功之速

行經後少腹疼痛二十二

婦人有少腹疼於行經之後者人以爲氣血之虛也誰知是腎氣之涸乎夫經水者乃天一之眞水也滿則溢而虛則閉亦其常耳何以虛能作疼哉蓋腎水一虛則水不能生木而肝木必尅脾土木土相爭則氣必逆故爾作疼治法必須以舒肝氣爲主而益之以補腎之味則水足而肝氣益安肝氣安而逆氣自順又何疼痛之有哉方用調肝湯

山藥五錢炒　阿膠三錢白麪炒　當歸三錢酒洗　白芍三錢酒炒

山萸肉三錢蒸熟　巴戟一錢鹽水浸　甘草一錢

經前經後腹痛二方極有神效[illegible]不可減去一味

水煎服此方平調肝氣既能轉逆氣又善止鬱疼經後之症以此方調理最佳不特治經後腹疼之症也

經前腹痛吐血二十三

婦人有經未行之前一二日忽然腹疼而吐血人以為火熱之極也誰知是肝氣之逆乎夫肝之性最急宜順而不宜逆順則氣安逆則氣動血隨氣為行止氣安則血安氣動則血動亦勿怪其然也或謂經逆在腎不在肝何以隨血妄行竟至從口上出也是肝不藏血之故乎抑腎不納氣而然乎殊不知少陰之火急如奔馬得肝火直沖而上其勢最捷反經而為血亦至便也正不必肝不藏血始成吐血之症但此等吐血與各經之吐血有不同者蓋各經之吐血由內傷而成經逆而吐血

婦人年壯吐血往往有之不可作勞症治若認爲勞症必至肝氣愈逆非勞反成勞矣方加茜草一錢懷牛膝八分尤妙

乃內溢而激之使然也其症有絕異而其氣逆則一也治法似宜平肝以順氣而不必益精以補腎矣雖然經逆而吐血雖不大損夫血而反覆顛倒未免太傷腎氣必須於補腎之中用順氣之法始爲得當方用順經湯

當歸五錢酒洗 大熟地九蒸五錢 白芍酒炒二錢 丹皮五錢

白茯苓三錢 沙參三錢 黑芥穗三錢

水煎服一劑而吐血止二劑而經順十劑不再發此方於補腎調經之中而用引血歸經之品是和血之法實寓順氣之法也肝不逆而腎氣自順腎氣既順又何經逆之有哉

經水將來臍下先疼痛二十四

婦人有經水將來三五日前而臍下作疼狀如刀刺者

衝任之氣宜通不宜降故化濕不用蒼朮薏仁餘宜類參

或寒熱交作所下如黑豆汁人莫不以為血熱之極誰知是下焦寒濕相爭之故乎夫寒濕乃邪氣也婦人有衝任之脈居於下焦衝為血海任主胞胎為血室均喜正氣相通最惡邪氣相犯經水由二經而外出而寒濕滿二經而內亂兩相爭而作疼痛邪愈盛而正氣日衰寒氣生濁而下如豆汁之黑者見北方寒水之象也治法利其濕而溫其寒使衝任無邪氣之亂臍下自無疼痛之疚矣方用溫臍化濕湯

白朮一兩土炒　白茯苓三錢　山藥五錢炒　巴戟肉五錢鹽水浸

扁豆三錢炒搗　白果十枚搗碎　建蓮子三十枚不去心

水煎服然必須經未來前十日服之四劑而邪氣去經水調兼可種子此方君白朮以利腰臍之氣用巴

戟白菓以通任脉扁豆山藥蓮子以衞衝脉所以寒濕掃除而經水自調可受妊矣倘疑腹疼爲熱疾妄用寒涼則衝任虛冷血海變爲冰海血室反成冰室無論難於生育而疼痛之止又安有日哉

經水過多二十五

婦人有經水過多行後復行面色痿黃身體倦怠而困乏之愈甚者人以爲血熱有餘之故誰知是血虛而不歸經乎夫血旺始經多血虛當經縮今曰血虛而反經多是何言與殊不知血歸於經雖旺而經亦不多血不歸經雖衰而經亦不少世之人見經水過多謂是血之旺也此治之所以多錯耳倘經多果是血旺自是健壯之體須當一行即止精力如常何至一行後而再行而困

荆芥穗炭能引血歸經方妙極不可輕易加減

乏氣力耶惟經多是血之虛故再行而不勝其困乏之血損精散骨中髓空所以不能色華於面也治法宜大補血而引之歸經又安有行後復行之病哉方用加減四物湯

大熟地一兩九蒸 白芍三錢酒炒 當歸五錢酒洗 川芎二錢酒洗 白朮五錢上炒 黑芥穗三錢 山萸三錢蒸 續斷一錢 甘草一錢

水煎服四劑而血歸經矣十劑之後加人參三錢再服十劑下月行經適可而止矣夫四物湯乃補血之神品加白朮荊芥補中有利加山萸續斷止中有行加甘草以調和諸品使之各得其宜所以血足而歸經歸經而血自靜矣

與胖人不孕參看自得立方之

經前洩水 二十六

婦人有經未來之前洩水三日而後行經者人以為血旺之故誰知是脾氣之虛乎夫脾統血脾虛則不能攝血矣且脾屬濕土脾虛則土不實土不實而濕更甚所以經水將動而脾先不固脾經所統之血欲流注於血海而濕氣乘之所以先洩水而後行經也調經之法不在先治其水而在先治其血抑不在先治其血而在先補其氣蓋氣旺而血自能生抑氣旺而濕自能除且氣旺而經自能調矣方用健固湯

人參五錢 白茯苓三錢 白朮土炒一兩 巴戟五錢鹽水浸 薏苡仁炒三錢

水煎連服十劑經前不洩水矣此方補脾氣以固脾

若大便下血過多精神短少人愈消瘦必係肝氣不舒久鬱傷脾脾傷不能統血又當分別治之方用補血湯
嫩黃芪二兩

血則血攝於氣之中脾氣日盛自能運化其濕濕既化爲烏有自然經水調和又何至經前泄水哉

經前大便下血二十七

婦人有行經之前一日大便先出血者人以爲血崩之症誰知是經流於大腸乎夫大腸與行經之路各有分別何以能入乎其中不知胞胎之系上通心而下通腎心腎不交則胞胎之血兩無所歸而心腎二經之氣不來照攝聽其自便所以血不走小腸而走大腸也治法若單止大腸之血則愈止而愈多若擊動三焦之氣則更拂亂而不可止蓋經水之妄行原因心腎之不交今不使水火之既濟而徒治其胞胎則胞不之氣無所歸而血安有歸經之日故必大補其心與腎使心腎之氣

牛膝各半 當歸身酒洗 炒黑 杭芍炭二錢 焦白术一五 炒杜仲二錢 續斷 荊芥炭一二 姜炭一二 引用貫仲炭一小塊 入服之四劑必獲愈 愈後減半再服不剖 經入大腸必当行經之際而大使下血也 初病血虛

交而胞胎之氣自不散則大腸之血自不妄行而經自順矣方用順經兩安湯

當歸五錢酒洗　白芍五錢酒炒　大熟地五錢九蒸　山萸肉二錢蒸
人參三錢　白朮五錢土炒　麥冬五錢去心　黑芥穗二錢
巴戟肉一錢鹽水浸　升麻四分

水煎服二劑大腸血止而經從前陰出矣三劑經止而兼可受妊矣此方乃大補心肝腎三經之藥全不去顧胞胎而胞胎有所歸者以心腎之氣交也蓋心腎虛則其氣兩分心腎足則其氣兩合心與腎不離而胞胎之氣聽命於二經之攝又安有妄動之形哉然則心腎不交補心腎可也又何兼補肝木耶不知肝乃腎之子心之母也補肝則肝氣往來於心腎

之間自然上引心而下入於腎下引腎而上入於心不啻介紹之助也此使心腎相交之一大法門不特調經而然也學者其深思諸

年未老經水斷 二十八

經云女子七七而天癸絕有年未至七七而經水先斷者人以爲血枯經閉也誰知是心肝脾之氣鬱乎使其血枯安能久延於人世醫見其經水不行妄謂之血枯耳其實非血之枯乃經之閉也且經原非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸世人以經爲血此千古之誤牢不可破倘果是血何不名之曰血水而曰經水乎古昔聖賢創呼經水之名者原以水出於腎乃癸

干之化故以名之無知世人沿襲血不深思其旨皆以血耗之然則經水早斷似乎腎水衰涸吾以爲心肝脾氣之鬱者蓋以腎水之生原不由於心肝脾而腎水之化實有關於心肝脾使水位之下無土氣以承之則水濫滅火腎氣不能化火位之下無水氣以承之則火炎鑠金腎氣無所生木位之下無金氣以承之則木妄破土腎氣無以成倘心肝脾有一經之鬱則其氣不能入於腎中腎之氣卽鬱而不宣矣況心肝脾俱鬱卽腎氣眞足而無虧尚有茹而難吐之勢矧腎氣水虛又何能盈滿而化經水外洩耶經曰亢則害此之謂之此經之所以閉塞有似乎血枯而實非血枯耳治法必須散心肝脾之鬱而大補其腎水仍大補其心肝脾之氣則精

夫人皆祇服此補劑初之品而大病盡除

不善醫者立異矜奇不惟無效反致百病殼士凡用藥雜亂不金石為上品者戒之戒之

溢而經水自通矣方用益經湯

大熟地一兩九蒸　白朮一兩土炒　山藥五錢炒　當歸五錢酒洗

白芍三錢酒炒　生棗仁三錢搗碎　丹皮一錢　沙參三錢

柴胡一錢　杜仲一錢炒黑　人參二錢

水煎連服八劑而經通矣服三十劑而經不再閉兼可受孕此方心肝脾腎四經同治藥也妙在補以通之散以開之倘徒補則鬱不開而生火徒散則氣益衰而耗精設或用攻堅之劑辛熱之品則非徒無益而又害之矣

身瘦不孕二十九

婦人有瘦怯身軀久不孕育一交男子即卧病終朝人以為氣虛之故誰知是血虛之故乎或謂血藏於肝精

涵於腎变感乃洩腎之精與血虛何與殊不知肝氣不開則精不能洩腎精既洩則肝氣亦不能舒以腎為肝之母母既洩精不能分潤以養其子則木燥之水而火且暗動以鑠精則腎愈虛矣况瘦人多火而又洩其精則水益少而火益熾水雖制火而腎精空乏無力以濟成火在水上之卦所以倦怠而臥也此等之婦偏易動火然此火因貪慾而出於肝木之中又是虛燥之火絕非眞火也且不交合則已交合又偏易走洩此陰虛火旺不能受孕卽偶爾受孕必致逼乾男子之精隨種而隨消者有之治法必須大補腎水而平肝木水旺則血旺血旺則火消便成水在火上之卦方用養精種玉湯

大熟地九蒸一兩 當歸酒洗五錢 白芍酒炒五錢 山萸肉蒸熟五錢

服藥三月後不受孕仍照前方加杜仲二炒斷續斷二錢白朮五錢土炒焦雲苓錢服數劑後必

水煎服三月便可身健受孕斷可種子此方之用不特補血而純於塡精精滿則子宮易於攝精血足則子宮易於容物皆有子之道也惟是貪欲者多節欲者少往往不驗服此者果能節慾三月心靜神清自無不孕之理否則不過身體壯健而已勿咎方之不靈也

胸滿不思食不孕三十

婦人有飲食少思胸膈滿悶終日倦怠思睡一經房事呻吟不已人以為脾胃之氣虛也誰知是腎氣不足乎夫氣宜升騰不宜消降升騰於上焦則脾胃易於分運降陷於下焦則脾胃難於運化人乏水穀之養則精神自爾倦怠脾胃之氣可升而不可降也明甚然則脾胃

胸滿不孕人每誤爲脾胃虛寒不能進食用扶脾消導之藥腎氣愈虛何能受孕妙在立方不峻補腎火所以不用桂附等藥但專補腎氣使脾胃之氣不復下陷則滯

之氣雖充於脾胃之中實生於兩腎之內無腎中之水氣則胃之氣不能騰無腎中之火氣則脾之氣不能化惟有腎之水火二氣而脾胃之氣始能升騰而不降也然則補脾胃之氣可不急補腎中水火之氣乎治法必以補腎氣爲主但補腎而不兼補脾胃之品則腎之水火二氣不能提於至陽之上也方用并提湯

大熟地一兩九蒸　巴戟一兩鹽水浸　白朮一兩土炒　人參五錢

黃芪五錢生用　山萸肉三錢蒸　枸杞二錢　柴胡五分

水煎服三月而腎氣大旺再服一月未有不能受孕者此方補氣之藥多於補精似乎以補脾胃爲主矣孰知脾胃健而生精自易是補脾胃之氣與血正所以補腎之精與水也又益以補精之味則陰氣自足

孫一奎尤胞胎氣煖自然受孕無難矣

陽氣易升自爾騰越於上焦矣陽氣不下陷則無非大地陽春隨遇皆是化生之機安有不受孕之理與

下部冰冷不受孕 三十

婦人有下身冰冷非火不煖交感之際陰中絕無溫熱之氣人以爲天分之薄也誰知是胞胎寒之極乎夫寒冰之地不生草木重陰之淵不長魚龍今胞胎既寒何能受孕雖男子鼓勇力戰其精甚熱直射於子宮之內而寒冰之氣相逼亦不過茹之於暫而不能不吐之於久也夫猶是人也此婦之胞胎何以寒涼至此豈非天分之薄乎非也蓋胞胎居於心腎之間上繫於心而下繫於腎胞胎之寒涼乃心腎二火之衰微也故治胞胎者必須補心腎二火而後可方用溫胞飲

今之種子者多喜服熱藥不知此方特為胞胎寒者設若胞胎有熱則不宜服審之不可減去一味

白朮一兩土炒　巴戟一兩鹽水浸　人參三錢　杜仲三錢炒黑
兎絲子三錢酒浸炒　山藥三錢炒　芡實三錢炒　肉桂二錢去粗研
附子二分製　補骨脂二錢鹽水炒

水煎服一月而胞胎熱此方之妙補心而即補腎溫腎而即溫心心腎之氣旺則心腎之火自生心腎之火生則胞胎之寒自散原因胞胎之寒以至茹而即吐而今胞胎既熱矣尚有施而不受者乎若改湯為丸朝夕吞服尤能攝精斷不至有伯道無兒之歎也

胸滿少食不孕三十二

婦人有素性恬淡飲食少則平和多則難受或作嘔泄胸膈脹滿久不受孕人以為賦稟之薄也誰知是脾胃虛寒乎夫脾胃之虛寒原因心腎之虛寒耳蓋胃土非

少食不孕與胸滿少思飲食有間一補腎中之氣一補命門與心包絡之火藥味不多其君臣佐使之妙宜細參之

心火不能生脾土腎火不能化心腎之火衰則脾胃失生化之權即不能消水穀以化精微矣既不能化水穀之精微自無津液以灌溉於胞胎之中欲胞胎有溫煖之氣以養胚胎必不可得縱然受胎而帶脈無力亦必墮落此脾胃虛寒之咎故無玉麟之毓也治法可不急溫補其脾胃乎然脾之母原在腎之命門胃之母原在心之包絡欲溫補脾胃必須補二經之火蓋母旺子必不弱母熱子必不寒此子病治母之義也方用溫土毓麟湯

巴戟一兩去心酒浸　覆盆子一兩酒浸蒸　白朮五錢土炒　人參三錢

懷山藥五錢炒　神麯一錢炒

水煎服一月可以種子矣此方之妙溫補脾胃而又

兼補命門與心包絡之火藥味不多而四經並治命門心包之火旺則脾與胃無寒冷之虞子母相顧二家和合自然飲食多而善化氣血旺而能任帶脈有力不虞落胎安有不玉麟之育哉

少腹急迫不孕 二十一

婦人有少腹之間自覺有緊迫之狀急而不舒不能生育此人人之所不識也誰知是帶脈之拘急乎夫帶脈繫於腰臍之間宜弛而不宜急今帶脈之急者由於腰臍之氣不利也而腰臍之氣不利者由於脾胃之氣不足也脾胃氣虛則腰臍之氣閉腰臍之氣閉則帶脈拘急遂致牽動胞胎精即直射於胞胎胞胎亦暫能茹納而力難負載必不能免小產之虞況人多不能節慾安

凡種子治法不出帶脈胞胎二經數言已洩造化之秘矣

得保其不墜乎此帶脈之急所以不能生子也治法宜寬其帶脈之急而帶脈之急不能遽寬也宜利其腰臍之氣而腰臍之氣不能遽利也必須大補其脾胃之氣與血而腰臍可利帶脈可寬自不難於孕育矣方用寬帶湯

白朮一兩土炒　巴戟肉五錢酒浸　補骨脂一錢鹽水炒　人參三錢
麥冬三錢去心　杜仲三錢炒黑　大熟地五錢九蒸　肉蓯蓉三錢洗淨
白芍三錢酒炒　當歸二錢酒洗　五味三分炒　建蓮子二十粒不去心

水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月即受胎此方之妙脾胃兩補而又利其腰臍之氣自然帶脈寬舒可以載物而勝任矣或疑方中用五味白芍之酸收不增帶脈之急而反得帶脈之寬殊不可解豈知帶

脉之急由於氣血之虛蓋血虛則縮而不伸氣虛則攣而不達用芍藥之酸以平肝木則肝不尅脾用五味之酸以生腎水則腎能益帶似相妨而實相濟也何疑之有

嫉妬不孕 三十四

婦人有懷抱素惡不能生子者人以爲天心厭之也誰知是肝氣鬱結乎夫婦人之有子也必然心脉流利而滑脾脉舒徐而和腎脉旺大而鼓指始稱喜脉未有三部脉鬱而能生子者也若三部脉鬱肝氣必因之而更鬱肝氣鬱則心腎之脉必致鬱之極而莫解蓋子母相依鬱必不喜喜必不鬱也其鬱而不能成胎者以肝木不舒必下尅脾土而致塞脾土之氣塞則腰臍之氣必

此方似平平無奇然却能解妬種子不可忽視直有懷嫉而仍然嫉如必致血枯墮胎即幸不墮胎生子多不能成方加解妬飲合服之可保無虞必須變其性情始效

解妬飲 一黍穀 白格飲麥

不利腰臍之氣不利必不能通任脈而達帶脈則帶脈之氣亦塞矣帶脈之氣既塞則胞胎之門必閉精即到門亦不得其門而入矣其奈之何哉治法必解四經之鬱以開胞胎之門則幾矣方用開鬱種玉湯

白芍一兩酒炒 香附三錢酒炒 當歸五錢酒洗 白朮五錢土炒 丹皮三錢酒洗 茯苓三錢去皮 花粉二錢

水煎服一月則鬱結之氣開鬱開則無非喜氣之盈腹而嫉妬之心亦可以一易自然兩相合好結胎於頃刻之間矣此方之妙解肝氣之鬱宣脾氣之困而心腎之氣亦因之俱舒所以腰臍利而任帶通達不必啟胞胎之門而胞胎自啟不特治嫉妬者也

肥胖不孕 三十九

脏小黑豆各四十九粒豆炒熟扁糖五十五粒

婦人有身體肥胖痰涎甚多不能受孕者人以爲氣虛之故誰知是濕盛之故乎夫濕從下受乃言外邪之濕也而肥胖之濕實非外邪乃脾土之內病也然脾土既病不能分化水穀以養四肢宜其身軀瘦弱何以能肥胖乎不知濕盛者多肥胖肥胖者多氣虛氣虛者多痰涎外似健壯而內實虛損也內虛則氣必衰氣衰則不能行水而濕停於腸胃之間不能化精而化涎矣夫脾本濕土又因痰多愈加其濕脾不能受必浸潤於胞胎日積月累則胞胎竟變爲江洋之水窟矣且肥胖之婦內肉必滿遮隔子宮不能受精此必然之勢也況又加以水濕之盛即男子甚健陽精直達子宮而其水勢滔滔泛濫可畏亦遂化精成水矣又何能成妊哉治法必

再十劑後方加杜仲一錢半炒断絲續断錢半炒必受孕矣

須以洩水化痰爲主然徒洩水化痰而不急補脾胃之氣則陽氣不旺濕痰不去人先病矣烏望其茹而不吐乎方用加味補中益氣湯

人參三錢 黃芪生用三錢 柴胡一錢 甘草一錢 當歸酒洗三錢 白朮土炒一兩 升麻四分 陳皮五分 茯苓五錢 半夏製三錢

水煎服八劑痰涎盡消再十劑水濕利子宮涸出易於受精而成孕矣其在於昔則如望洋觀海而至於今則是馬到成功也快哉此方之妙妙在提脾氣而升於上作雲作雨則水濕反利於下行助胃氣而消於下爲津爲液則痰涎轉易於上化不必用消化之品以損其肥而肥自無碍不必用濬決之味以開其竅而竅自能通陽氣充足自能攝精濕邪散除自可

瘦極何肥胖不孕之足慮乎

骨蒸夜熱不孕二十六

婦人有骨蒸夜熱遍體火焦口乾舌燥咳嗽吐沫難於生子者人以爲陰虛火動也誰知是骨髓內熱乎夫寒陰之地固不生物而乾旱之田豈能長養然而骨髓與胞胎何相關切而骨髓之熱卽能使人不嗣此前賢所未言者也山一旦創言之不幾爲世俗所駭乎而要知不必駭也此中實有其理焉蓋胞胎爲五臟外之一臟耳以其不陰不陽所以不列於五臟之中所謂不陰不陽者以胞胎上繫於心包下繫於命門繫心包者通於心心者陽也繫命門者通於腎腎者陰也是陰之中有陽陽之中有陰所以通於變化或生男或生女俱從此

治骨髓熱所以不用熱迪方極[illegible]者萬[illegible]識[illegible]桑病[illegible]分即[illegible]不必[illegible]二十劑[illegible]十劑之[illegible]三元生

出然必陰陽協和不偏不枯始能變化生人否則否矣況胞胎既通於腎而骨髓亦腎之所化也骨髓熱由於腎之熱腎熱而胞胎亦不能不熱且胞胎非骨髓之養則嬰兒無以生骨骨髓過熱則骨中空虛惟存火烈之氣又何能成胎治法必須清骨中之熱然骨熱由於水虧必補腎之陰則骨熱除珠露有滴濡之喜矣壯水之主以制陽光此之謂也方用清骨滋腎湯

地骨皮一兩酒洗　丹皮五錢　沙參五錢　麥冬五錢去心

元參五錢酒洗　五味子五分炒研　白朮三錢土炒　石斛二錢

水煎連服三十劑而骨熱解再服六十劑自受孕此方之妙補腎中之精涼骨中之熱不清胞胎而胞胎自無太熱之患然陰虛內熱之人原易受妊今因骨

髓過熱所以受精而變燥以致難於育子本非胞胎之不能受精所以稍補其腎以殺其火之有餘而益其水之不足使易種子耳

腰酸腹脹不孕三十七

婦人有腰酸背楚胸滿腹脹倦怠欲卧百計求嗣不能如願人以為腰腎之虛也誰知是任督之困乎夫任脉行於前督脉行於後然皆從帶脉之上下而行也故任脉虛則帶脉墜於前督脉虛則帶脉墜於後雖胞胎受精亦必小產況任督之脉既虛而疝瘕之症必起疝瘕碍胞胎而外障則胞胎縮於疝瘕之內往往精施而不能受雖餌以玉燕亦何益哉治法必須先去其疝瘕之病而補其任督之脉則提挈天地把握陰陽呼吸精氣

此方爲有疝瘕而設故用沙參荸薺粉鱉甲以破堅即氣若無疝瘕去此三味加白术一兩人參一兩中澤瀉一錢甘枸杞仁三味服之經澀腹脹自然矣醫中義氣不可誤服惟有疝瘕與本門合宜之

包裹成形力足以勝任而無虞矣外無所障內有所容安有不能生育之理方用升帶湯

白朮一兩土炒 人參三錢 沙參五錢 肉桂一錢去粗研 荸薺粉三錢 鱉甲三錢炒 茯苓三錢 半夏一錢製 神麯一錢炒

水煎連服三十劑而任督之氣旺再服三十劑而疝瘕之症除此方利腰臍之氣正升補任督之氣也任督之氣升而疝瘕自有難容之勢況方中有肉桂以散寒荸薺以祛積鱉甲之攻堅茯苓之利濕有形自化於無形滿腹皆升騰之氣矣何至受精而再墜乎哉

便澁腹脹足浮腫不孕三十八

便性腹脹於浮腫此症極多不惟不能受孕擲用此係雜症久

婦人有小水艱澁腹脹腳腫不能受孕者人以爲小腸之熱也誰知是膀胱之氣不化乎夫膀胱原與胞胎相近膀胱病而胞胎亦病矣蓋水濕之氣必走膀胱而膀胱不能自化必得腎氣相通始能化水以出陰器倘膀胱無腎氣之通則膀胱之氣化不行水濕之氣必且滲入胞胎之中而成汪洋之勢汪洋之田又何能生物也哉治法必須壯腎氣以分消胞胎之濕益腎火以達化膀胱之水使先天之本壯則膀胱之氣化胞胎之濕除而汪洋之田化成雨露之壤矣水化則膀胱利火旺則胞胎煖安有布種而不發生者哉方用化水種子湯

巴戟鹽水浸一兩　白朮土炒一兩　茯苓五錢　人參三錢

菟絲子酒炒五錢　芡實炒五錢　車前酒炒二錢　肉桂去粗研一錢

而不愈甚有成勞瘵不治者此方補水而不助濕補火而使外原善極不可加減・味若無好肉桂以破故紙一不代之用核桃仁二箇陳皮燒用丹皮用仁作引若用好肉桂節可不用核作引

水煎服二劑膀胱之氣化四劑艱澁之症除又十劑虛脹腳腫之病形消而服六十劑腎氣大旺胞胎溫煖易於受胎而生育矣此方利膀胱之水全在補腎中之氣煖胞胎之氣全在壯腎中之火至於補腎之藥多是濡潤之品不以濕而益助其濕乎然方中之藥妙於補腎之火而非補腎之水尤妙於補火而無燥烈之虞利水而非蕩滌之猛所以膀胱氣化胞胎不濕而發榮長養無窮與

女科上卷終

妊娠

惡阻　順肝益氣湯

浮腫　加減補中益氣湯

少腹疼　安奠二天湯

口乾咽疼　潤燥安胎湯

吐瀉腹疼　援土固胎湯

子懸脇疼　解鬱湯

跌損　救損安胎湯

胎漏　助氣補漏湯

子鳴　扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂　息焚安胎湯

正產

產後

外有肝鬱氣悶胸脅脹滿見食不思不能多食雖係妊娠而非

陽曲傅　山青主手著

妊娠惡阻三十九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲臥人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝為腎之子日食母氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而腎水不能應則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以其能生肝之血也然補肝以生血未為不佳但生血而

惡阻宜分期治之後另有方

方極效但蘇子一兩疑是一錢之誤然國初上元生人稟賦故壯或非用一兩不效今當下元用一錢可也萬不可

不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔猶恐氣虛則血不易生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆者補其氣則逆轉況補氣於補血之中則陰足以制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣湯

人參一兩 當歸一兩酒洗 蘇子一兩炒研 白朮三錢土炒 茯苓二錢

熟地五錢九蒸 白芍三錢酒炒 麥冬三錢去心 陳皮三分 砂仁一粒炒研

神麴一錢炒

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡

川一兩

疏肝化濕湯全當歸酒洗六錢杭芍酒炒三錢黨參去蘆三錢白扁豆去皮四錢雲苓二錢香附炒焦二錢砂仁炒研錢半條芩炒焦八分神麴炒焦錢半廣皮八分薄荷八分甘草五分水煎服

阻者俱以此方投之無不安最有益於胎婦其功更勝於四物焉

妊娠浮腫四十

妊婦有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以為溼氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺為大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不蔭非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而溼邪即乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣

白朮一時分名以蒼朮充之凡白朮緊皆要者白朮補脾者朮扶脾用者宜審君臣其微以白扁豆山藥代之較妥

血虛而然耶治法當補其脾之血與肺之氣不必袪溼而溼自無不去之理方用加減補中益氣湯

人參五錢 黃芪三錢生用 柴胡一錢 甘草一分 當歸三錢酒洗
白朮五錢土炒 茯苓一兩 升麻三分 陳皮三分

水煎服四劑即愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而血非氣不生是補氣即所以生血觀當歸補血湯用黃芪爲君則較著彰明矣況溼氣乘脾肺之虛而相犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也只補氣而助以利溼之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利溼爲君乎嗟嗟溼症而不以此藥爲君將以何者爲君乎況重

用茯苓於補氣之中雖曰滲溼而仍是健脾清濕之意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參朮合實補多於利所以重用之以分溼邪即以補氣血耳

妊娠少腹疼 四十一

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墮之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脉而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脉無力胞胎即無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷即色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墜之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也

人參一兩無力者以黨參代之無上黨參者以嫩黃芪代之

是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

人參一兩去蘆　熟地一兩九蒸　白朮一兩土炒　山藥五錢炒　炙草一錢
山萸五錢蒸去核　杜仲三錢炒黑　枸杞二錢　扁豆五錢炒去皮

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功所以寡效此方正妙在多用也

妊娠口乾咽痛 四十二

妊婦至三四個月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安甚則血流如經水人以為火動之極也

[illegible]用 [illegible]萬 [illegible]暖 [illegible]豆 [illegible]等 [illegible]可 [illegible]而 加黃芩

誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相結而成逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水虧又何能動胎必腎經之火動而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之不足所以火炎而胎必動補水則胎自安亦既濟之義也惟是腎水不能遽生必須滋補肺金金潤則能生水而水有逢源之樂矣水既有本則源泉混混矣而火又何難制乎再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用潤燥安胎湯

熟地一兩九蒸 生地三錢酒炒 山萸肉五錢蒸 麥冬五錢去心

五味一錢炒 阿膠二錢蛤粉炒 黄芩二錢酒炒 益母二錢

水煎服二劑而燥息再二劑而胎安連服十劑而胎

不再動矣此方專塡腎中之精而兼補肺然補肺仍是補腎之意故腎經不乾燥則火不能灼胎焉有不安之理乎

妊娠吐瀉腹疼 四十三

妊婦上吐下瀉胎動欲墮腹疼難忍急不可緩此脾胃虛極而然也夫脾胃之氣虛則胞胎無力必有崩墜之虞況又上吐下瀉則脾與胃之氣因吐瀉而愈虛欲胞胎之無恙也得乎然胞胎疼痛而究不至下墜者何也全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則交於心其氣通於胞胎此胞胎之所以欲墜而不得也且腎氣能固則陰火必來生脾心氣能通則心火必來援胃脾胃雖虛而未絕則胞胎雖動而不墮可不急救其

白朮多偽肉桂更無佳者用者甚有真藥固妙如無真藥白朮以白扁豆代之肉桂以破故紙代之

脾胃乎然脾胃當將絕而未絕之時只救脾胃而難遽生更宜補其心腎之火使之生土則兩相接續胎自固而安矣方用援土固胎湯

人參一兩 白朮二兩土炒 山藥一兩炒 肉桂二錢去粗研
製附子五分 續斷三錢 杜仲三錢炒黑 山萸一兩蒸去核
枸杞三錢 兎絲子三錢酒炒 砂仁三粒炒研 炙草一錢

水煎服一劑而洩止二劑而諸病盡愈矣此方救脾胃之土十之八救心腎之火十之二也救火輕於救土者豈以土欲絕而火未甚衰乎非也蓋土崩非重劑不能援火衰雖小劑而可助熱藥多用必有太燥之虞不比溫胃之品也況胎動係土衰而非火弱何用太熱妊娠忌桂附是恐傷胎豈可多用小熱之品

計之以錢大熱之品計之以分者不過用以引火而非用以壯火也其深思哉

妊娠子懸脇疼四十四

妊婦有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛如弓上弦人止知是子懸之病也誰知是肝氣不通乎夫養胎半係於腎水然非肝血相助則腎水實有獨力難支之勢故保胎必滋腎水而肝血斷不可不顧使肝氣不鬱則肝之氣不閉而肝之血必旺自然灌溉胞胎合腎水而並協養胎之力今肝氣因憂鬱而閉塞則胎無血蔭腎難獨任而胎安得不上升以覔食此乃鬱氣使然也莫認為子之欲自懸而妄用泄子之品則得矣治法宜開肝氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定矣方用

方加薏仁三四錢尤妙

解鬱湯

人參一錢 白朮五錢土炒 白茯苓三錢 當歸一兩酒洗 白芍一兩酒炒 枳殼五分炒 砂仁三粒炒研 山梔子三錢炒 薄荷二錢

水煎服一劑而悶痛除二劑而子懸定至三劑而全安去梔子再多服數劑不復發此乃平肝解鬱之聖藥鬱開則木不尅土肝平則火不妄動方中又有健脾開胃之品自然水精四布而肝與腎有潤澤之機則胞胎自無燥之患又何慮上懸之不愈哉

妊娠跌損四十五

妊婦有失足跌損致傷胎元腹中疼痛勢如將墮者人只知是外傷之為病也誰知有內傷之故乎凡人內無他症胎元堅固即或跌撲閃挫依然無恙惟內之氣血

即用尋常白朮土炒焦最妙以其能理氣行血也於白朮味過甘不能理氣行血用者知之

素虧故畧有閃挫胎便不安若止作閃挫外傷治斷難奏功且恐有因治而反墮者可不慎與必須大補氣血而少加以行瘀之品則瘀散胎安矣但大補氣血之中又宜補血之品多於補氣之藥則無不得之方用救損安胎湯

當歸一兩酒洗　白芍三錢酒炒　生地一兩酒炒　白朮五錢土炒
炙草一錢　人參一錢　蘇木三錢搗碎　乳香一錢去油
沒藥一錢去油

水煎服一劑而疼痛止二劑而勢不不墜矣不必三劑也此方之妙妙在既能去瘀而不傷胎又能補氣補血而不凝滯因無通利之害亦痊跌閃之傷有益無損大建奇功即此方與然不特治懷孕之閃挫也

即無娠則挫亦可用之

妊娠小便下血病名胎漏　四十六

妊婦有胎不動腹不疼而小便中時常有血流出者人以爲血虛胎漏也誰知氣虛不能攝血乎夫血只能蔭胎而胎中之蔭血必賴氣以衛之氣虛下陷則蔭胎之血亦隨氣而陷矣然則氣虛下陷而血未嘗虛似不應與氣同陷也不知氣乃血之衛血賴氣以固氣虛則血無憑依無憑依必燥急燥急必生邪熱血寒則靜血熱則動動則外出而莫能遏又安得不下流乎倘氣不虛而血熱則必大崩而不止些微之漏矣治法宜補其氣之不足而洩其火之有餘則血不必止而自無不止矣

方用助氣補漏湯

補血不用當歸妙以當歸之香竄也

人參一兩 白芍五錢酒炒 黃芩三錢酒炒黑 生地三錢酒炒黑 益母草一錢 續斷二錢 甘草一錢

水煎服一劑而血止二劑再不漏矣此方用人參以補陽氣用黃芩以洩陰火火洩則血不熱而無欲動之機氣旺則血有依而無可漏之竅氣血俱旺而和協自然歸經而各安其所矣又安有漏洩之患哉

妊娠子鳴 門十七

妊婦懷胎至七八個月忽然兒啼腹中腰間隱隱作痛人以為胎熱之過也誰知是氣虛之故乎夫兒之在胞胎也全憑母氣以化成母呼兒亦呼母吸兒亦吸未嘗有一刻之間斷至七八個月則母氣必虛矣兒不能隨母之氣以為呼吸必有迫不及待之勢母子原相依為

黃芪用嫩黃芪不可用箭芪箭芪係北口外苜蓿根

命子失母之氣則拂子之意而啼於腹中似可異而究不必異病名子鳴氣虛甚也治宜大補其氣使母之氣與子氣和合則子之意安而啼亦息矣方用扶氣止啼湯

人參一兩　黃芪生用一兩　麥冬去心一兩　當歸酒洗五錢

橘紅五分　甘草一錢　花粉一錢

水煎服一劑而啼即止二劑不再啼此方用人參黃芪麥冬以補肺氣使肺氣旺則胞胎之氣亦旺胞胎之氣旺則胞中之子氣有不隨母之氣以為呼吸者未之有也

妊娠腰腹疼渴汗燥狂 四十八

婦人懷妊有口渴汗出大飲冷水而煩燥發狂腰腹疼

痛以致胎欲墮者人莫不謂火盛之極也抑知是何經之火盛乎此乃胃火炎熾熬煎胞胎之水以致胞胎之水涸胎失所養故動而不安耳夫胃為水穀之海多氣多血之經所以養五臟六腑者蓋萬物皆生於土土氣厚而物始生土氣薄而物必死然土氣之所以能厚者全賴火氣之來生也胃之能化水穀者亦賴火氣之能化也今胃中有火宜乎生土何以火盛而反致害乎不知無火難以生土而火多又能爍水雖土中有火土不死然亦必有水方不燥使胃火太旺必致爍乾腎水土中無水則自潤不足又何以分潤胞胎土燥之極火勢炎蒸犯心越神兒胎受逼安得不下墜乎經所謂二陽之病發心脾者正此義也治法必須泄火滋水使水氣

原方不可加減

妊娠燥狂方誤有別症不日痰其即云時疾傳經面罷妊娠於不問誤服多藥數月不愈甚有打去胎而以顧大人者命爲名有史鶴糊奎之極

得旺則火氣自平火平則汗狂燥渴自除矣方用息焚

安胎湯

生地酒炒一兩　靑蒿五錢　白朮土炒五錢　茯苓三錢

人參三錢　知母二錢　花粉二錢

水煎服一劑而狂少平二劑而狂大定三劑而火盡解胎亦安矣此方藥料頗重恐人慮不勝而不敢全用又不得不再爲囑之懷胎而火勝若此非大劑何以能蠲火不息則狂不止而胎能安耶況藥料雖多均是滋水之味益而無損勿過慮也

妊娠中惡　四十九

婦人懷子在身痰多吐涎偶遇鬼神祟惡忽然腹中疼痛胎向上頂人疑爲子懸之病也誰知是中惡而胎不

輔正逐邪方殊不正如此而知用[illegible]之藥以依歲若於奇立異欲速服效不知反耗人之真氣戒之

安平大凡不正之氣最易傷胎故有孕之婦斷不宜入廟燒香與僻靜陰寞之地如古洞幽岩皆不可登盖邪祟多在神宇潛蹤幽陰岩洞亦其往來遊戲之所觸之最易相犯不可不深戒也况孕婦又多痰涎眼目易眩目一眩如有妄見此招祟之因痰而起也人云怪病每起於痰其信然與治法似宜以治痰爲主然治痰必至耗氣氣虛而痰難消化胎必動揺必須補氣以生血補血以活痰再加以清痰之品則氣血不虧痰亦易化矣

方用消惡安胎湯

當歸一兩酒洗　白芍一兩酒炒　白朮五錢土炒　茯苓五錢

人參三錢　甘草一錢　陳皮五分　花粉三錢

蘇葉一錢　沉香一錢研末

此方大補氣血輔正邪自除之義也

妊娠多怒墮胎五十

婦人有懷妊之後未至成形或已成形其胎必墮人皆曰氣血衰微不能固胎也誰知是性急怒多肝火大動而不靜乎夫肝本藏血肝怒則不藏不藏則血難固蓋肝雖屬木而木中實寄龍雷之火所謂相火是也相火宜靜不宜動靜則安動則熾況木中之火又易動而難靜人生無日無動之時即無日非動火之時大怒則火益動矣火動而不可止遏則火勢飛揚不能生氣養胎而反食氣傷精矣精傷則胎無所養勢必不墜而不已經所謂少火生氣壯火食氣正此義也治法宜平其肝中之火利其腰臍之氣使氣生夫血而血清其火則庶

性急怒多內不用舒肝氣者以其有胎娠故也經云胎病則母病胎安則母病自愈所以姙娠一門總以補氣養血安胎為主則母病自除矣

幾矣方用利氣瀉火湯

人參三錢 白朮一兩土炒 甘草一錢 熟地五錢九蒸
當歸三錢酒洗 白芍五錢酒炒 芡實三錢炒 黃芩二錢酒炒

水煎服六十劑而胎不墜矣此方名雖利氣而實補氣也然補氣而不加以瀉火之品則氣旺而火不能平必反害其氣也故加黃芩於補氣之中以瀉火又有熟地歸芍以滋肝而壯水之主則血不燥而氣得和怒氣息而火自平不必利氣而氣無不利即無往而不利矣

行房小產五十一

姙婦因行房顛狂遂致小產血崩不止人以為火動之極也誰知是氣脫之故乎大凡婦人之懷姙也賴腎水

小產血崩多由行房而致若年

以蔭胎水源不足則火易沸騰加以久戰不已則火必大動再至興酣顛狂精必大洩精大洩則腎水益涸而龍雷相火益熾水火兩病胎不能固而墮矣胎墮而火猶未息故血隨火而崩下有不可止遏之勢人謂火動之極亦未爲大誤也但血崩本於氣虛火盛本於水虧腎水既虧則氣之生源涸矣氣源既涸而氣有不脫者乎此火動是標而氣脫是本也經云治病必求其本本固而標自立矣若只以止血爲主而不急固其氣則氣散不能速回而血何由止不大補其精則水涸不能遽長而火且益熾不揣其本而齊其末山未見有能濟者也方用固氣塡精湯

人參一兩 黃芪一兩生用 白朮五錢土炒 大熟地一兩九蒸

芪宜倍用熟地宜減半用以其氣虛火衰也否則毋令氣脱不救凡有妊娠者須忍慾謹避房事萬勿自蹈危途反之

當歸酒洗五錢 三七研末沖三錢 芥穗炒黑二錢

水煎服二劑而血止二劑而身安四劑則全愈此方之妙妙在不去清火而惟補氣補精其奏功獨神者以諸藥溫潤能除大熱也蓋熱是虛故補氣自能攝血補精自能止血意在本也

跌閃小產五十二

妊婦有跌扑閃挫遂致小產血流紫塊昏暈欲絕者人皆曰瘀血作祟也誰知是血室損傷乎夫血室與胞胎相連如脣齒之相依胞胎有傷則血室亦損脣亡齒寒理有必然也然胞胎傷損而流血者其傷淺血室傷損而流血者其傷深傷之淺者疼在腹傷之深者暈在心同一跌扑損傷而未小產與已小產治各不同未小產

胎未墮宜加杜仲黑炭一錢上五炒黑一一若胎已反服原方血崩不止加五靈炭三錢若血悶心暈加元胡炭一錢

而胎不安者宜顧其胎而不可輕去其血已小產而血大崩宜散其瘀而不可重傷其氣蓋胎已墮血既脫而血室空虛惟氣存耳倘或再傷其氣安保無氣脫之憂乎經云血爲營氣爲衛使衛有不固則營無依而安矣故必補氣以生血新血生而瘀血自散矣方用理氣散瘀湯

人參二兩　黃芪一兩生用　當歸五錢酒洗　茯苓三錢

紅花一錢　丹皮三錢　薑炭五錢

水煎服一劑而流血止二劑而昏暈除三劑而全安矣此方用人參黃芪以補氣氣旺則血可攝也用當歸丹皮以生血血生則瘀難留也用紅花黑薑以活血血活則暈可除也用茯苓以利水水利則血易歸

大便乾結小產五十三

妊婦有口渴煩燥舌上生瘡兩唇腫裂大便乾結數日不得通以致腹疼小產者人皆曰大腸之火熱也誰知是血熱爍胎乎夫血所以養胎也溫相則胎受其益太熱則胎受其損如其熱久爍之則兒在胞胎之中若有探湯之苦難以存活則必外越下奔以避炎氣之逼迫欲其胎之不墜也得乎然則血蔭乎胎則血必虛耗血者陰也虛則陽亢亢則害矣且血乃陰水所化血日蔭胎取給刻不容緩而火爍陰水不能速生以化血所以陰虛火動陰中無非火氣血中亦無非火氣矣兩火相合焚逼兒胎此胎之所以下墜也治法宜清胞中之火補腎中之精則可已矣或疑兒已下墜何故再顧其胞

血不蔭胎何必大補其水殊不知火動之極以致胎墜則胞中純是一團火氣此火乃虛火也實火可瀉而虛火宜於補中清之則虛火易散而眞火可生倘一味清涼以降火全不顧胞胎之虛實勢必至寒氣逼人胃中生氣蕭索矣胃乃二陽資養五臟者也胃陽不生何以化精微以生陰水乎有不變爲勞瘵者幾希矣方用加減四物湯

熟地五錢九蒸 白芍三錢生用 當歸一兩酒洗 川芎一錢
山梔子三錢炒 山萸二錢蒸去核 山藥三錢炒 丹皮三錢炒

此方加條芩二錢尤妙

水煎服四五劑而愈矣

丹皮性極涼血產後用之最防陰凝之害愼之

畏寒腹疼小產五十四

妊婦有畏寒腹疼因而墮胎者人只知下部太寒也誰知是氣虛不能攝胎乎夫人生於火亦養於火非氣不充氣旺則火旺氣衰則火衰人之所以坐胎者受父母先天之眞火也先天之眞火即先天之眞氣以成之故胎成於氣亦攝於氣氣旺則胎牢氣衰則胎墮胎日加長而氣日加衰安得不墮哉況又遇寒氣外侵則內之火氣更微火氣微則長養無資此胎之不能不墮也使當其腹疼之時即用人參乾薑之類補氣祛寒則可以疼止而胎安無如人拘於妊娠之藥禁而不敢用因致墮胎而僅存幾微之氣不急救氣尚有何法方用黃芪補氣湯

黃芪二兩生用 當歸一兩酒洗 肉桂五分去粗皮研

肉桂須好的如無佳者用炮姜代之或一錢二錢皆可不此用五分

水煎服五劑愈矣倘認定是寒大用辛熱全不補氣與血恐過於燥熱反致亡陽而變危矣

大怒小產五十五

妊婦有大怒之後忽然腹疼吐血因而墮胎及墮胎之後腹疼仍未止者人以爲肝之怒火未退也誰知是血不歸經而然乎夫肝所以藏血者也大怒則血不能藏宜失血而不當墮胎何爲失血而胎亦隨墮乎不知肝性最急血門不閉其血直搗於胞胎胞胎之系通於心腎之間肝血來冲必斷絕心腎之路胎因心腎之路斷胞胎失水火之養所以墮也胎既墮矣而腹疼如故者蓋因心腎未接欲續無計彼此痛傷肝氣欲歸於心而心不受欲歸於腎而腎不納故血猶未靜而疼無已也

產後忌用白芍因其酸寒也胎墮後用白芍五錢惟上元生人可若下元生人斷不可用必不得已而用之將白芍炒炭用三錢可也餘藥如法製

治法宜引肝之血仍入於肝而腹疼自已矣然徒引肝之血而不平肝之氣則氣逆而不易轉即血逆而不易歸也宜用引氣歸血湯

白芍五錢 酒炒 當歸五錢 酒洗 白朮三錢 土炒 甘草一錢
黑芥穗三錢 丹皮三錢 薑炭五分 香附五分 酒炒
麥冬三錢 去心 鬱金一錢 醋炒

水煎服此方名爲引氣其實仍是引血也引血亦所以引氣氣歸於肝之中血亦歸於肝之內氣血兩歸而腹疼自止矣

血虛難產 五十六

妊娠有腹疼數日不能生產人皆曰氣虛力弱不能送子出產門誰知是血虛膠滯胞中無血兒難轉身乎夫

方妙若頭產交骨不開加炙龜板尾三錢生過子婦人頭心髮三錢洗淨用新瓦一個置火上

胎之成成於腎臟之精而胎之養養於五臟六腑之血故血旺則子易生血衰則子難產所以臨產之前宜用補血之藥補血而血不能遽生必更兼補氣以生之然不可純補其氣也恐陽過於旺則血仍不足偏勝之害必有升而無降亦難產之漸也防微杜漸其惟氣血兼補乎使氣血並旺則氣能推送而血足以濟之是汪洋之中自不難轉身也又何有膠滯之患乎方用送子丹

生黃芪一兩 當歸一兩酒洗 麥冬一兩去心 熟地五錢九蒸

川芎三錢

水煎服二劑而生矣且無橫生倒產之患此補血補氣之藥也二者相較補血之味多於補氣之品蓋補氣止用黃芪一味其餘無非補血之品血旺氣得所

燒髮成灰入藥同煎服下即效

養氣生血得所依胞胎潤澤自然易產譬如舟遇水淺之處雖大用人力終難推行忽逢春水泛濫舟自躍躍欲行再得順風以送之有不揚帆而迅行者乎

交骨不開難產五十七

妊婦有兒到產門竟不能下此危急存亡之時也人以爲胞胎先破水乾不能滑利也誰知是交骨不開之故乎蓋產門之上原有骨二塊兩相鬬合名曰交骨未產之前其骨自合若天衣之無縫臨產之際其骨自開如開門之見山婦人兒門之肉原自斜生皮亦横長實可寬可窄可大可小者也苟非交骨連絡則兒門必然大開可以手入探取胞胎矣此交骨爲兒門之下關實婦人鎖鑰之鍵此骨不開則腸可直下此骨不開則兒難

方屬子巳[illegible]門[illegible]急[illegible]子[illegible]臨門血

降生然而交骨之能開能合者氣血主之也血旺而氣衰則兒雖向下而兒門不開氣旺而血衰則兒門可開而兒難向下是氣所以開交骨血所以轉兒身也欲生産之順利非大補氣血不可然交骨之閉甚易而交骨之開甚難臨産交骨不開者多由於産前貪慾洩精大甚精洩則氣血失生化之本而大虧矣氣血虧則無以運潤於兒門而交骨粘滯不開矣故欲交骨之開必須於補氣補血之中而加開骨之品兩相合治自無不開之患不必催生而兒自迅下母子俱無恙矣方用降子湯

當歸一兩　人參五錢　川芎五錢　紅花一錢
川牛膝三錢　柞木枝一兩

凡推產宜服前送子丹不可遽服此方

水煎服一劑兒門必响亮一聲交骨開解而兒乃降生矣此方用人參以補氣芎歸以補血紅花以活血牛膝以降下柞木枝以開關解骨君臣作使同心協力所以取效如神在用開於補之中也然單用柞木枝亦能開骨但不補氣與血恐開而難合未免有下部中風之患不若此方之能開能合之爲神妙也至於兒未臨門之時萬不可先用柞木以開其門然用降子湯亦正無妨以其能補氣血耳若欲單用柞木必須候到門而後可

脚手先下難產　五十八

妊婦生產之際有脚先下而兒不得下者有手先下而兒不得下者人以爲横生倒產至危之症也誰知是氣

若服三劑
後以針刺
兒手足仍

血兩虧之故乎夫兒在胞胎之中兒身正坐男面向後女面向前及至生時頭必旋轉而向下生此天地造化之奇非人力所能勉强者雖然先天與後天原並行而不悖天機之動必得人力以濟之所謂人力者非產母用力之謂也謂產母之氣與血耳產母之氣血足則胎必順產母之氣血虧則胎必逆順則易生逆則難産氣血既虧母身必弱子在胞中亦必弱胎弱無力欲轉頭向下而不能此胎之所以有脚手先下者也當是之時急用針刺兒之手足則兒必痛而縮入急用轉天湯以救順之

人參二兩 當歸二兩酒洗 川芎一兩 川牛膝三錢

升麻四分 附子一分製

不轉身以針刺產婦合骨穴兒卧下萬不可使穩婆用手探取以致子母俱危戒之

水煎服一劑而兒轉身矣再二劑自然順生此方之妙用人參以補氣之虧用芎歸以補血之虧人人皆知其義若用升麻又用牛膝附子恐人未識其妙也蓋兒已身斜非用提挈則頭不易轉然轉其身非用下行則身不易降升麻牛膝並用而又用附子者欲其無經不達使氣血迅速以催生也

氣逆難產 五十九

婦人有生產數日而胎不下者服催生之藥皆不見效人以為交骨之難開也誰知是氣逆不行而然乎夫交骨不閉固是難產然兒頭到產門而不能下者方是交骨不開之故自當用開骨之劑若兒頭尚未到產門乃氣逆不行兒身難轉非交骨不開之故也若開其交骨

凡臨產三日前必先腹痛一小次名曰試痛此時萬勿坐草臨盆但將包兒諸物預備現成不可早叫穩婆來過三日發腹若大痛方叫穩婆來不可令產婦見面暫讓別室靜待不可高言蓋穩婆名曰收生使其兩手接

則兒門大開兒頭未轉而向下必致變症非常是兒門萬萬不可輕開也大凡生產之時切忌坐草太早若兒未轉頭原難驟生乃早於坐草產婦見兒許久不下未免必懷恐懼恐懼則神怯怯則氣下而不能升氣既不升則上焦閉塞而氣乃逆矣上氣既逆而上焦必脹滿而氣益難行氣沮滯於上下之間不利氣而徒催生則氣愈逆而胎愈閉矣治法但利其氣兒自轉身而下矣方用舒氣散

人參一兩 當歸一兩酒洗 川芎五錢 白芍五錢酒炒 紫蘇梗三錢 牛膝二錢 陳皮一錢 柴胡八分 葱白七寸水煎服一劑而逆氣轉兒即下矣此方利氣而實補氣蓋氣逆由於氣虛氣虛易於恐懼補其

收不欲兒臨地受傷非穩婆別有妙法也若穩婆來之即令產婦見面彼必胡言此時用力力早必致難產百變叢生艱之慎之

氣而恐懼自定恐懼定而氣逆者將莫知其何以定也何必開交骨之多事乎哉

子死產門難產六十

婦人有生產三四日兒已到產門交骨不開兒不得下子死而母未亡者服開骨之藥不驗當有死亡之危今幸而不死者正因其子死而胞胎下墜子母離開母氣已收未至同子氣俱絶也治但救其母而不必顧其子矣然死子在產門塞其下口有致母死之患宜用推送之法補血以生水補氣以生血使氣血兩旺死子可出而存母命也倘徒用降子之劑以墜之則死子未必下而母氣先脫矣非救援之善者也山親見此等之症常用救母丹活人頗多故誌之

方妙不可
加減

人參一兩 當歸酒洗二兩 川芎二兩 益母草一兩

赤石脂一錢 芥穗炒黑三錢

水煎服一劑而死子下矣此方用芎歸以補血人參以補氣氣旺血旺則上能升而下能降氣能推而血能送況益母又善下死胎石脂能下瘀血自然一滑而出無少阻滯矣

子死腹中難產六十一

婦人有生產六七日胞衣已破而子不見下人以為難產之故也誰知是子已死於腹中乎夫兒死於兒門之邊易辨而死於腹中難識蓋兒已到產門之邊未死者頭必能伸能縮已死者必然不動即以手推之亦必不動如故若係未死用手少拔其兒之髮兒必退入故曰

下死胎而用厚樸妙曾有產婦面黑舌青用補氣養

易辨若兒死在腹中何從而知之然實有可辨而知之者凡子死腹中而母可救者產母之面必無煤黑之氣是子死而母無死氣也子死腹中而母難救產母之面必有烟燻之氣是子死而母亦無生機也以此辨死生斷斷不爽也旣知兒死腹中不能用藥以降之危道也若用霸道以瀉之亦危道也蓋生產至六七日其母之氣必甚困乏烏能勝霸道之治如用霸道以強逐其死子恐死子下而母亦立亡矣必須仍補其母使母之氣血旺而死子自下也方用療兒散

人參一兩　當歸二兩酒洗　川牛膝五錢　鬼臼三錢研水飛

乳香二錢去油

水煎服一劑死子下而母生矣凡兒之降生必先轉

回活血之藥而子母俱得皆全也亦萬中之一幸也

其頭原因其無氣血之虛以致兒不能轉頭以向下世人用催生之藥以耗兒之氣血則兒之氣不能通達反致閉悶而死於腹中此實庸醫殺之也所以難產之救斷斷不可用催生之藥只宜補氣補血以壯其母而全活嬰兒之命正無窮也此方救兒死之母仍大補氣血所以救其本也誰知救本即所以催生哉

正產胞衣不下 六十二

產婦有兒已下地而胞衣留滯於腹中二三日不下心煩意燥時欲昏暈人以為胞衣之蒂未斷也誰知是血少乾枯粘連於腹中乎世人見胞衣不下未免心懷疑懼恐其冲之於心而有死亡之兆然而胞衣究何能上

沖於心也但胞衣不下瘀血未免難行恐有血暈之虞耳治法仍宜大補其氣血使生血以送胞衣則胎衣自然潤滑潤滑則易下生氣以助生血則血生自然迅速尤易催墮也方用送胞湯

當歸二兩酒洗 川芎五錢 益母草一兩 乳香一兩不去油

沒藥一兩不去油 芥穗三錢炒黑 麝香五釐研另沖

水煎服立下此方以芎歸補其氣血以荊芥引血歸經用益母乳香等藥逐瘀而下胞衣新血既生則舊血難存氣旺上升而瘀濁自降尚有留滯之苦哉夫胞衣是包兒之一物非依於子即依於母子生而不隨子俱下以子之不可依也故留滯於腹若有回順其母之心母胞雖已生子而其蒂間之氣原未遽絕

所以留連欲脫而未脫往往有存腹六七日不下而竟不腐爛者正以其尚有生氣也可見胞衣留腹不能殺人補之而自降耳或謂胞衣既有生氣補氣補血則胞衣亦宜堅牢何以補之而反降也不知子未下補則益於子子已下補則益於母益子而胞衣之氣連益母而胞衣之氣脫此胞胎之氣關通則兩合閉則兩開矣故大補氣血而胞衣反降也

有婦人子下地五六日而胞衣留於腹中百計治之竟不能下而又絕無昏暈煩燥之狀人以爲瘀血之粘連也誰知是氣虛不能推送乎夫瘀血在腹斷無不作祟之理有則必然發暈今安然無恙是血已淨矣血淨宜清氣升而濁氣降今胞衣不下是清氣下降而難升遂

至濁氣上浮而難降然濁氣上升又必有煩燥之病今亦安然者是清濁之氣兩不能升也然則補其氣不無濁氣之上升乎不知清升而濁降者一定之理未有清升而濁亦升者也苟能於補氣之中仍分其清濁之氣則升清正所以降濁也方用補中益氣湯

人參三錢　生黃芪一兩　柴胡三分　炙草一分

當歸五錢　白朮五分土炒　升麻三分　陳皮二分

萊菔子五分炒研

水煎服一劑而胞衣自下矣夫補中益氣湯乃提氣之藥也並非推送之劑何以能降胞衣如此之速也然而濁氣之不降者由於清氣之不升也提其氣則清升而濁降濁氣降則腹中所存之物即無不隨濁

氣而盡降正不必再用推送之法也況又加萊菔子數分能理濁氣不至兩相扞格所以奏功之奇也

正產氣虛血暈六十三

婦人甫產兒後忽然眼目昏花嘔惡欲吐中心無主或神魂外越恍若天上行雲人以為惡血冲心之患也誰知是氣虛欲脫而然乎蓋新產之婦血必盡傾血室空虛止存幾微之氣倘其人陽氣素虛不能生血心中之血前已蔭胎胎墮而心中之血亦隨胎而俱墮心無血養所賴者幾微之氣以固之耳今氣又虛而欲脫而君心無護所剩殘血欲奔回救主而血非正血不能歸經內庭變亂而成血暈之症矣治法必須大補氣血斷不可單治血暈也或疑血暈是熱血上冲而更補其血不

原方去效不可加減

愈助其上冲之勢乎不知新血不生舊血不散補血以生新血正活血以逐舊血也然血有形之物難以速生氣乃無形之物易於迸發補氣以生血尤易於補血以生血耳方用補氣解暈湯

人參一兩　生黃芪一兩　當歸一兩不酒洗　黑芥穗三錢

薑炭一錢

水煎服一劑而暈止二劑而心定三劑而血生四劑而血旺再不暈矣此乃解暈之聖藥用參芪以補氣使氣壯而生血也用當歸以補血使血旺而養氣也氣血兩旺而心自定矣用荊芥炭引血歸經用薑炭以行瘀引陽瘀血去而正血歸不必解暈而暈自解矣一方之中藥止五味而其奏功之奇而大如此其

補矣乎

正產血暈不語 六十四

產婦有子方下地即昏暈不語此氣血兩脫也本在不救然救之得法亦有能生者山得岐天師秘訣何敢隱而不宣乎當斯之時急用銀針刺其眉心得血出則語矣然後以人參一兩煎湯灌之無不生者即用黃芪二兩當歸一兩名當歸補血湯煎湯一碗灌之亦得生萬不可於二方之中輕加附子蓋附子無經不達反引氣血之藥走而不守不能專注於胞胎不若人參歸芪直救其氣血之絕聚而不散也蓋產婦昏暈全是血室空虛無以養心以致昏暈舌爲心之苗心既無主而舌又安能出聲耶夫眉心之穴上通於腦下通於舌而其系

則連於心刺其眉心則腦與舌俱通而心之清氣上升則瘀血自然下降矣然後以參芪當歸之能補氣生血者煎湯灌之則氣與血接續又何至於死亡乎雖單用參芪當歸亦有能生者然終不若先刺眉心之爲更妙世人但知灸眉心之法不知刺更甦於灸蓋灸法緩而刺法急緩則難於救絕急則易於回生所謂急則治其標緩則治其本者此也

正產敗血攻心暈狂六十五

婦人有產後二三日發熱惡露不行敗血攻心狂言呼叫甚欲奔走拏提不定人以爲邪熱在胃之過誰知是血虛心不得養而然乎夫產後之血盡隨胞胎而外越則血室空虛臟腑皆無血養只有心中之血尚存幾微

以護心君而臟腑失其所養皆欲取給於心心包爲心君之宰相攔絕各臟腑之氣不許入心始得心神安靜是護心者全藉心包之力也使心包亦虛不能障心而各臟腑之氣遂直入於心以分取乎心血心包情急旣不能內顧其君又不能外禦乎衆於是大聲疾呼號鳴勤王而其迹象反近於狂悖有無可如何之勢故病狀似熱而實非熱也治法須大補心中之血使各臟腑分取以自養不得再擾乎心君則心君泰然而心包亦安矣方用安心湯

當歸二兩　川芎一兩　生地炒五錢　丹皮炒五錢

生蒲黃二錢

乾荷葉一片引水煎服一劑而狂定惡露亦下矣此

加生化湯
當歸酒洗一兩一錢
川芎三錢
桃仁錢半
研荊芥反
沙炭一錢

方用芎歸以養血何以又用生地丹皮之涼血似非産後所宜不知惡露所以奔心原因虛熱相犯於補中涼之而涼不爲害況益之以荷葉七竅相通引邪外出不惟內不害心且佐蒲黄以分解乎惡露也但只可暫用以定狂不可多用以取咎也謹之慎之

正産腸下 六十六

産婦腸下亦危症也人以爲兒門不闗之故誰知是氣虛下陷而不能收乎夫氣虛下陷自宜用升提之藥以提其氣然新産之婦恐有瘀血在腹一旦提氣並瘀血升騰於上則冲心之患又恐變出非常是氣又不可竟提也氣既不可竟提而氣又下陷將用何法以治之哉蓋氣之下陷者因氣之虛也但補其氣則氣旺而腸自

生產有先未下腸子下者名盤腸生勿遽服此方並放以淨盆用開水洗次將腸置於盆內靜待勿驚子下後腸即徐徐收回若時久盆與腸俱冷不能速收急用開水一盆積溫以人得手爲度將腸水盛於盆再盆以腸熱氣充即

升舉矣惟是補氣之藥少則氣力薄而難以上升必須以多爲貴則陽旺力強斷不能降而不升矣方用補氣升腸飲

人參（去蘆一兩） 生黃芪（一兩） 當歸（酒洗一兩） 白朮（土炒五錢）
川芎（酒洗三錢） 升麻（一分）

水煎服一劑而腸升矣此方純於補氣全不去升腸即如用升麻一分亦不過引氣而升耳蓋升麻之爲用少則氣升多則血升也不可不知又方用蓖麻仁四十九粒搗塗頂心以提之腸升即刻洗去時久則恐吐血此亦升腸之一法也

產後少腹疼　六十七

婦人產後少腹疼痛甚則結成一塊按之愈疼人以爲

[illegible]逐瘀[illegible]子先下急服此方少遲恐氣瘀不散

產後一方疼痛不必加減

兒枕之疼也誰知是瘀血而作祟乎夫兒枕者前人謂兒頭枕之物也兒枕之不疼豈兒生不枕而反疼是非兒枕可知矣既非兒枕何故作疼乃是瘀血未散結作成團而作疼耳凡此等症多是壯健之婦血有餘而非血不足也似乎可用破血之藥然血活則瘀自除血結則瘀作祟若不補血而反敗血雖瘀血可消畢竟耗損難免不若於補血之中以行逐瘀之法則氣血不耗而瘀亦盡消矣方用散結定疼湯

當歸一兩酒洗　川芎五錢酒洗　丹皮二錢炒　益母草三錢
黑芥穗二錢　乳香一錢去油　山查十粒炒黑　桃仁七粒泡去皮尖炒

水煎服一劑而疼止而愈不必再劑也此方逐瘀於補血之中消塊於生血之內妙在不專攻疼病而疼

病止欲世人一見兒枕之疼動用元胡蘇木蒲黃靈
脂之類以化塊又何足論哉

婦人產後少腹疼痛按之即止人亦以爲兒枕之疼也誰知是血虛而然乎夫產後亡血過多血室空虛原能腹疼十婦九然但疼有虛實之分不可不辨如燥糖觸體光景是虛疼而非實疼也大凡虛疼宜補而產後之虛疼尤宜補焉惟是血虛之疼必須用補血之藥而補血之味多是潤滑之品恐與大腸不無相碍然產後血虛腸多乾燥潤滑正相宜也何碍之有方用腸寧湯

當歸一兩酒洗　熟地一兩九蒸　人參三錢　麥冬三錢去心
阿膠三錢蛤粉炒　山藥三錢炒　續斷二錢　甘草一錢
肉桂二分去粗研

水煎服一劑而疼輕二劑而疼止多服更宜此方補氣補血之藥也然補氣而無太鬱之憂補血而無太滯之患氣血既生不必止疼而疼自止矣

産後氣喘六十八

婦人産後氣喘最是大危之症苟不急治立刻死亡人只知是氣血之虚也誰知是氣血兩脫乎夫既氣血兩脫人將立死何又能作喘然此血將脫而氣猶未脫也血將脫而氣欲挽之而反上喘如人救溺援之而力不勝又不肯自安於不救乃召號同志以求助故呼聲而喘作其症雖危而可救處正在能作喘也蓋肺主氣喘則肺氣似盛而實衰當是之時血將脫而萬難驟生望肺氣之相救甚急若赤子之望慈母然而肺因血失止

方妙不可
加減

存幾微之氣自顧尚且不暇又何能提挈乎血氣不與血俱脫者幾希矣是救血必須補氣也方用救脫活母湯

人參二兩　當歸一兩酒洗　熟地一兩九蒸　枸杞子五錢

山萸五錢蒸去核　麥冬一兩去心　阿膠二錢蛤粉炒　肉桂一錢去粗研

黑芥穗二錢

水煎服一劑而喘輕二劑而喘減三劑而喘定四劑而全愈矣此方用人參以接續元陽然徒補其氣而不補其血則陽燥而狂雖回生於一時亦旋得旋失之道即補血而不補其肝腎之精則本原不固陽氣又安得而續乎所以又用熟地山萸枸杞之類以大補其肝腎之精而後大益其肺氣則肺氣健旺升提

有力矣特慮新產之後用補陰之藥膩滯不行又加肉桂以補命門之火使火氣有根助人參以生氣且能運化地黃之類以化精生血若過於助陽萬一血隨陽動瘀而上行亦非保全之策更加荊芥以引血歸經則肺氣安而喘速定治幾其神乎

產後惡寒身顫六十九

婦人產後惡寒惡心身體顫發熱作渴人以為產後傷寒也誰知是氣血兩虛正不敵邪而然乎大凡人之氣不虛則邪斷難入產婦失血既多則氣必大虛氣虛則皮毛無衛邪原易入正不必戶外之風來襲體也即一舉一動風即可乘虛而入之然產後之婦風易入而亦易出凡有外邪之感俱不必祛風況產婦之惡寒者寒

宜速服數劑不可只服一劑

由內生也發熱者熱由內弱也身顫者顫由氣虛也治其內寒而外寒自散治其內弱而外熱自解壯其元陽而身顫自除方用十全大補湯

人參三錢　白朮土炒三錢　茯苓去皮三錢　甘草炙一錢　川芎酒洗一錢　當歸酒洗三錢　熟地九蒸五錢　白芍酒炒二錢　黃芪生用一兩　肉桂去粗研一錢

水煎服一劑而諸病悉愈此方但補氣與血之虛而不去散風與邪之實正以正足而邪自除也況原無邪氣乎所以奏功之捷也

產後惡心嘔吐七十

婦人產後惡心欲嘔時而作吐人皆曰胃氣之寒也誰知是腎氣之寒乎夫胃為腎之關胃之氣寒則胃氣不

服此方必待惡露盡後若初產一二日之內惡心欲嘔乃惡露

能行於腎之中腎之氣寒則腎氣亦不能行於胃之內是腎與胃不可分而兩之也惟是產後失血過多必致腎水乾涸腎水涸應腎火上炎當不至胃有寒冷之虞何故腎寒而胃亦寒乎蓋新產之餘水乃遽然涸去虛火尚不能生火既不生而寒之象自現治法宜補其腎中之火然火無水濟則火在水上未必不成火動陰虛之症必須於水中補火腎中溫胃而後腎無太熱之患胃有既濟之歡也方用溫腎止嘔湯

熟地五錢九蒸　巴戟一兩鹽水浸　人參三錢　白朮一兩土炒
山萸五錢蒸去核　炮薑一錢　茯苓二錢去皮　白蔻一粒研
橘紅五分薑汁洗

水煎服一劑而嘔吐止二劑而不再發四劑而全愈

矣此方補腎之藥多於治胃之品然而治腎仍是治胃也所以腎氣升騰而胃寒自解不必用大熱之劑溫胃而祛寒也

產後血崩七十二

少婦產後半月血崩昏暈目見鬼神人皆曰惡血冲心也誰知是不慎房幃之過乎夫產後業踰半月雖不比初產之二三日而氣血初生尚未全復卽血路已淨而胞胎之損傷未痊斷不可輕於一試以重傷其門戶無奈少嬌之婦氣血初復不知愼養慾心大動貪合圖歡以致血崩昏暈目見鬼神是心腎兩傷不特胞胎門戶已也明明是旣犯色戒又加酣戰以致大洩其精精洩而神亦隨之而欲脫此等之症乃自作之孽多不可活

上衝宜服加味生化湯全當歸一兩酒洗川芎二錢炮薑一錢東查炭二錢桃仁一錢研用無灰黃酒一鍾水三鍾同煎

亦有中氣素虛產後頃刻血崩不止宗亦

隨之而以此至危之證十常不救者八九惟用獨參湯倘可救活一二遂人參去蘆五錢打碎急煎遲則氣脫不反待其煎成徐徐灌之待氣回再煎一服灌之其餘治法參看血崩門但產後不可用杭芍炭以及諸涼藥然此證皆

然於不可活之中而思一急救之法舍大補其氣與血別無良法也方用救敗求生湯

人參二兩　當歸酒洗二兩　白朮土炒二兩　九蒸熟地一兩

山萸蒸五錢　山藥炒五錢　棗仁生用五錢　附子自製一分或一錢

水煎服一劑而神定二劑而暈止三劑而血亦止矣倘一服見效連服三四劑減去一半再服十劑可慶更生此方補氣以回元陽於無何有之鄉陽回而氣回自可攝血以歸神生精而續命矣

產後手傷胞胎淋漓不止七十二

婦人有生產之時被穩婆手入產門損傷胞胎因而淋漓不止欲少忍須臾而不能入謂胞破不能再補也孰知不然夫破傷皮膚尚可完補豈破在腹內者獨不可

保臨產二日前人為久職所致戒之

胞破諸書單方多然不如此之妙

治瘡或謂破在外可用藥外治以生皮膚破在內雖有靈膏無可救補然破之在內者外治雖無可施力安必內治不可奏功乎試思瘡傷之毒大有缺陷尚可服藥以生肌肉此不過收生不謹小有所損並無惡毒何難補其缺陷也方用完胞飲

人參一兩 白朮十兩土炒 茯苓三錢去皮 生黃芪五錢

當歸一兩酒炒 川芎五錢 桃仁十粒泡炒研 紅花一錢

益母草三錢 白芨末一錢

用豬羊胞一個先煎湯後煎藥飢服十劑全愈夫胞損宜用補胞之藥何以反用補氣血之藥也蓋生產本不可手探試而穩婆竟以手探胞胎以致傷損則難產必矣難產者因氣血之虛也產後大傷氣血是

虛而又虛矣因虛而損復因損而更虛若不補其氣與血而胞胎之破何以奏功乎今之大補其氣血者不啻飢而與之食渴而與之飲也則精神大長氣血再造而胞胎何難補完乎所以旬日之內便成功也

產後四肢浮腫七十三

產後四肢浮腫寒熱往來氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛人皆曰敗血流於經絡滲於四肢以致氣逆也誰知是肝腎兩虛陰不得出之陽乎夫產後之婦氣血大虧自然腎水不足腎火沸騰然水不足則不能養肝而肝木大燥木中乏津木燥火發腎火有黨子母兩焚火焰直冲而上尅肺金金受火刑力難制肝而咳嗽喘滿之病生焉肝火既旺而下尅脾土土受木刑力

方炒不可
加減白芍
宜炒炭用

難制水而四肢浮腫之病出焉然而肝木之火旺乃假象而非眞旺也假旺之氣若盛而實不足故時而熱時而寒往來無定乃隨氣之盛衰以爲寒熱而寒非眞寒熱亦非眞熱是以氣逆於胸膈之間而不舒耳兩脇者肝之部位也酸者肝之氣味也吐酸脇疼痛皆肝虛而營不能勞之象也治法宜補血以養肝補精以生血精血足而氣自旺而寒熱咳嗽浮腫之病悉退矣方用補氣湯

人參三錢　茯苓去皮三錢　白朮土炒三錢　當歸酒洗五錢
白芍酒炒五錢　熟地九蒸一兩　山萸蒸三錢　山藥炒五錢
芡實炒三錢　故紙鹽水炒一錢　柴胡五分

水煎服三劑效十劑痊此方皆是補血補精之品何

以名爲轉氣耶不知氣逆由於氣虛乃是肝腎之氣虛也補肝腎之精血即所以補肝腎之氣也蓋虛則逆旺則順是補即轉也氣轉而各症盡愈陰出之陽則陰陽無扞格之虞矣

產後肉線出七十四

婦人有產後水道中出肉線一條長二三尺動之則疼痛欲絕人以爲胞胎之下墜也誰知是帶脉之虛脫乎夫帶脉束於任督之間任脉前而督脉後二脉有力則帶脉堅牢二脉無力則帶脉崩墜產後亡血過多無血以養任督而帶脉崩墜力難升舉故隨溺而隨下也帶脉下垂每每作痛於腰臍之間況下墜者而出於產門之外其失於關鍵也則甚安得不疼痛欲絕乎方用兩

[illegible]

收湯

人參一兩 白朮土炒二兩 川芎酒洗三錢 九[illegible]熟地二兩 山藥炒一兩 山萸四錢 芡實炒五錢 扁豆炒五錢 巴戟鹽水浸三錢 杜仲炒黑五錢 白果十枚搗碎

水煎服一劑而收半二劑而全收矣此方補任督而仍補腰臍者蓋以任督連於腰臍也補任督而不補腰臍則任督無助而帶脉何以升舉惟兩補之則任督得腰臍之助帶脉亦得任督之力而收矣

產後肝痿 七十五

婦人產後陰戶中垂下一物其形如帕或有角或二岐人以為產頹也誰知是肝痿之故乎夫產後何以成肝痿也蓋因產前勞役過傷又觸動怪怒以致肝不藏血

是白芍之品不可用歟

血亡過多故肝之脂膜隨血崩墜其形似子宮而實非子宮也若是子宮之下墜狀如茄子只到產門而不能越出於產門之外惟肝之脂膜往往出產門外者至六七寸許且有粘席乾落一片如手掌大者如是子宮墜落人立死矣又安得而復生乎治法宜大補其氣與血而少加升提之品則肝氣旺而易生肝血旺而易養肝得生養之力而脂膜自收方用收膜湯

生黃芪一兩 人參五錢 白朮五錢土炒 白芍五錢酒炒焦

當歸三錢酒洗 升麻一錢

水煎服一劑即收矣或疑產後禁用白芍恐伐生氣之原何以頻用之而奏功也是未讀仲景之書者嗟乎白芍之在產後不可頻用者恐其收斂乎瘀也而

誤伐生氣之源則誤矣況病之在肝者尤不可以不用且用之於大補氣血之中在芍藥亦忘其爲酸收矣又何能少有作祟者乎矧脂膜下墜正藉酸收之力助升麻以提升氣血所以奏功之捷也

產後氣血兩虛乳汁不下 七十六

婦人產後絕無點滴之乳人以爲乳管之閉也誰知是氣與血之兩涸乎夫乳乃氣血之所化而成也無血固不能生乳汁無氣亦不能生乳汁然二者之中血之化乳又不若氣之所化爲尤速新產之婦血已大虧血本自顧不暇又何能以化乳乳全賴氣之力以行血而化之也今產後數日而乳不下點滴之汁其血少氣衰可知氣旺則乳汁旺氣衰則乳汁衰氣涸則乳汁亦涸必

然之勢也世人不知大補氣血之妙而一味通乳豈知無氣則乳無以化無血則乳無以生不幾向餓人而乞食貧人而索金乎治法宜補氣以生血而乳汁自下不必利竅以通乳也方名通乳丹

人參一兩　生黃芪一兩　當歸二兩酒洗　麥冬五錢去心

木通三分　桔梗三分　七孔猪蹄二個去爪壳

水煎服二劑而乳如泉湧矣此方專補氣血以生乳汁正以乳生於氣血也產後氣血涸而無乳非乳管之閉而無乳者可比不去通乳而名通乳丹亦因服之乳通而名之今不通乳而乳生即名生乳丹亦可

產後鬱結乳汁不通七十七

少壯之婦於生產之後或聞丈夫之嫌或聽翁姑之誶

麥冬用小米炒不惟不損胃且得米味一直引入胃中而化乳愈速

遂致兩乳脹滿疼痛乳汁不通人以爲陽明之火熱也誰知是肝氣之鬱結乎夫陽明屬胃乃多氣多血之府也乳汁之化原屬陽明然陽明屬土壯婦產後雖云亡血而陽明之氣實未盡衰必得肝木之氣以相通始能化成乳汁未可全責之陽明也蓋乳汁之化全在氣而不在血今產後數日宜其有乳而兩乳脹滿作痛是欲化乳而不可得非氣鬱而何明明是羞憤成鬱土木相結又安能化乳而成汁也治法宜大舒其肝木之氣而陽明之氣血自通而乳亦通矣不必專去通乳也方名

通肝生乳湯

白芍五錢醋炒 當歸五錢酒洗 白朮五錢土炒 熟地三分

甘草三分 麥冬五錢去心 通草一錢 柴胡一錢

遠志一錢

水煎服一劑即通不必再服也

女科下卷終

瘟疫簡易奇方

瘟疫流行　水缸內每早投黑豆一握可以全家無恙再能五更時潛投黑豆一大升於井中勿令人見可保一方飲水者無恙

入瘟病家不染方　香油和雄黃蒼朮末塗鼻中可不染旣出病家即用紙條探鼻取嚏擦去如無雄黃蒼朮淨香油塗鼻亦可

姜酒避瘟法　凡瘟疫流行出門時先飲燒酒一盃然後再食別物不能飲酒者可食姜蒜或以塞鼻

通治疫癘外浴方　常以東行桃枝煎湯浴之未病已病皆治

通治時氣瘟症良方　生藕搗取汁一盅入蜜一合和勻分作兩服甚效　又治法用益元散二錢生姜三錢

搗黃酒水各半煎三滚温服即愈眞能解除瘟毒

菉豆飲　遇瘟疫初覺即用菉豆半斤煎湯將豆取出兌洋糖二兩温涼任病者自便渴則代茶飢則拌糖食豆既能解毒且兼涼散瘟疫初終俱可服食乃平易中之最佳最捷之良方也萬勿輕忽

治時瘟取汗方　白粳米一碗　葱頭連鬚二十根

上二樣加水煮粥煮一滚滚服取汗可以解瘟曾出汗者不用

異傳通治瘟疫屢驗奇方無論已傳經未傳經陰症陽症皆愈

金銀花三錢　生甘草二錢　好黃土五錢

小粒黑豆五錢微炒干萬別焦　白礬二錢

上五味用飯碗量水二碗半煎一飯碗臨臥温服至

次早天大亮時總合六個時辰必汗出即愈如不愈
次日臨臥再照方溫服一帖無不愈者真令人不能
思議之奇方也萬勿以平淡而忽之
右方嘉慶七年京師瘟疫流行家家染患此症死傷
甚多比時王相國名杰遇後半月後半夜赴　園值
日明月當天照如白晝行至德勝門外大道中間忽
須小解纔下轎即有老人向前云現在瘟疫盛行業
經傷人不少汝乃當朝宰相有調和燮理之責因何
值此袖手旁觀王端揆即答云豈奈我同不通醫何
老人云我也不深怪汝我現有治瘟之方汝能照方
行之即汝功也偷相接過看時月光之下好像容易
辨認不料不能爽目抬頭欲問時此老人已渺無路

跡矣心知有異公畢同家看係右開金銀花等五味用蜜和丸每重三錢卽率家丁如法修合施送纔三五日間求醫者日已盈千不止因施製不及遂將此方傳出令人煎水藥溫服奇在竟無不效者至今已四十餘年每遇瘟疫傷寒風症等症服之無不立見其功今年京師春瘟又將甚盛但服此方亦無不活者　此係千石橋西斜街高宅刊送者茲特重刊以廣其傳云

同治七年七月吉日刊

產後編上卷目錄

産後編上　共四十三症

陽曲傅　山青主手著

産後總論

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而産後尤甚是以丹溪先生論産後必大補氣血爲先雖有他症以末治之斯言盡治産之大旨若能擴充立方則治産可無過矣夫産後憂驚勞倦氣血暴虛諸症乘虛易入如有氣毋專耗散有食毋專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則血塊停滯熱則新血崩流至若中虛外感見三陽表症之多似可汗也在産後而用麻黃則重竭其陽見三陰裏症之多似可下也在産後而用承氣則重亡陰血耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譫語出汗乃元

弱似邪之症非同胃實厥由陽氣之衰無分寒熱非大補不能回陽而起弱痙因陰血之虧不論剛柔非滋榮不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作無期症似瘧也若以瘧治遷延難愈言論無倫神不守舍病似邪也若以邪治危亡可待去血過多而大便燥結肉蓯蓉加於生化非潤腸承氣之能通去汗過多而小便短澁六君子倍加參芪必生津助液之可利加參生化湯頻服救產後之危長生活命丹屢用甦絕穀之人癲疝脫肛多是氣虛下陷補中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參生化之劑產戶入風而痛甚服宜羗活養榮湯玉門傷涼而不閉洗宜蟆見黃硫散怔忡驚悸生化湯加以定志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而悶滿虛煩生化

湯加木香為佐因食而噯酸惡食六君子加神麯麥芽為臣蘇木莪朮大能破血青皮枳殼最消滿脹一應耗氣破血之劑汗吐宜下之法止可施諸壯實豈宜用於胎產大抵新產後先問惡露如何塊痛未除不可遽加參朮腹中痛止補中益氣無疑至若亡陽脫汗氣虛喘促頻服加參生化湯是從權也又如亡陰火熱血崩厥暈速煎生化原方是救急也王太僕云治下補下治以急緩緩則道路達而力微急則氣味厚而力重故治產當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付生死之重寄須若意於極危欲求俯仰之無虧用存心於愛物此雖未盡產症之詳然所闡一症皆援近鄉治驗為據亦未必無小補云

正產

正產者有腹或痛或止腰脇酸痛或勢急而胞未破名弄胎服八珍湯加香附自安有胞破數日而痛尚緩亦服上藥候之

傷產

傷產者胎未足月有所傷動或腹痛臍痛或服催生藥太早或產母努力太過逼兒錯路不能正產故臨月必舉動從容不可多睡飽食飲酒但覺腹中動轉即正身仰臥待兒轉順與其臨時費力不如先時慎重

調產

調產者產母臨月擇穩婆辦器用備參藥產時不可多人喧鬧二人扶身或憑物站心煩用滾水調白蜜一匙

與酒湯要或飯兒糜粥少許勿令飢渴有生息未順
者只說有雙胎或胎衣不下勿令產母驚恐

催生

催生者因坐草太早困倦難產用八珍湯稍佐以香附
乳香以助血氣胞衣早破漿血已乾亦用八珍湯

凍產

凍產者天寒血氣凝滯不能速生故衣裳宜厚產室宜
煖背心下體尤要

熱產

熱產者暑月宜溫涼得宜若產室人眾熱氣蒸逼致頭
痛面赤昏暈等症宜飲清水少許以解之然風雨陰涼
亦當避之

橫產

橫產者兒居母腹頭上足下產時則頭向下產母若用力逼之胎轉至半而橫當令產母安然仰臥令其自順穩婆以中指挾其肩勿使臍帶羈絆用催生藥努力即生

當歸　紫蘇各三錢　長流水煎服即下

一方用好京墨磨服之即下

一方用敗筆頭一個火煅以藕節自然汁調服之即下

一方用益母草六兩濃煎加童便一大杯調服即下

盤腸產

盤腸產者產則子腸先出然後生子其腸或未即收以

草麻子四十九粒研碎塗頭上腸收急急洗去遲則有害又方止用四十粒去皮研爲膏塗頂中收卽拭之如腸燥以磨刀水潤之再用磁石煎湯服之須陰陽家用過有驗者

難產

難產者交骨不開不能生產也服加味芎歸湯良久卽下

小川芎一兩 當歸一兩 敗龜版一個酒炙 婦人髮灰一握須用生過男女者爲末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎巳死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服卽下用童便

亦好後用補劑調理

下胞

胞衣不下用滚酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰一錢或以產母髮入口作吐胞衣即出有氣虛不能送出者腹心脹痛單用生化湯

全當歸一兩 川芎三錢 白朮一錢 香附一錢 加人參三錢更妙用水煎服

一方用蓖麻子二兩雄黃二錢研膏塗足下湧泉穴衣下急速洗去

平胃散

南蒼朮米泔水浸炒 厚樸薑炒 陳皮 炙草各二錢

共爲粗末或水煎或酒煎煎或時加樸硝二錢再煎

一二沸溫服

失笑散

五靈脂　蒲黃　俱研爲細末每服三錢熱酒下

斷臍

斷臍必以綿裹咬斷爲妙如遇天寒或因難產母子勞倦宜以大麻油紙燃徐徐燒斷以助元氣雖兒已死令煖氣入臍多得生切勿以刀斷之

滑胎散　臨月常服數劑以便易生

當歸三五錢川芎五七錢杜仲二錢熟地三錢枳殼七分山藥二錢水二鍾煎八分食前溫服如氣體虛弱人加人參白朮隨宜服之如便實多滯者加牛膝二錢

治產秘驗良方

治橫生逆產至數日不下一服即下有未足月忽然胎動一服即安或臨月先服一服保護無虞更能治胎死腹中及小產傷胎無乳者一服即如原體

全當歸 川芎各一錢五分 川貝母一錢去心 荊芥穗
黃芪各八分 厚樸薑炒 蘄艾 紅花各七分 兎絲子二錢
分白芍一錢二分冬月不用 枳殼六分麵炒 羌活六分麵炒 甘草五分

上十三味只用十二味不可加減安胎去紅花催生去蘄艾用井水鍾半薑三片為引熱服渣用水一鍾煎半鍾熱服如不好再用水一鍾煎半鍾服之即效不用二劑

催生兎腦丸 治橫生逆產神效

臘月兎腦髓一個 母丁香一個 乳香一錢另研 麝香一分 兎腦爲丸芡實大陰乾密封用時以溫酒一送下一九

奪命丹

臨產未產時目反口噤面黑唇青口中吐沫命在須臾若臉面微紅子死母活急用蛇退 蚕故子燒灰不存性 髮灰一錢 乳香五分 共爲細末酒下

加味芎歸湯 治子宮不收產門不閉

人參二錢 黃芪一錢 當歸二錢 升麻八分 川芎一錢 炙草四分 五味子十五粒 再不收加半夏八分 白芍八分酒炒

新產治法

生化湯先連進二服若胎前素弱婦人見危症熱症墮胎不可拘貼數服至病退乃止若產時勞甚血崩形脫卽加人參三四錢在內頻服無虞若氣促亦加人參加參於生化湯者血塊無滯不可以參爲補而弗用也有治產不用當歸者見偏之甚此方處置萬全必無一失世以四物湯治產地黃性寒滯血芍藥微酸無補伐傷生氣誤甚

產後用藥十誤

一因氣不舒而誤用耗氣順氣等藥反增飽悶陳皮用至五分禁枳實厚樸

二因傷氣而誤用消導反損胃氣至絕穀禁枳殼大黃蓬稜麯樸

三因身熱而誤用寒涼必致損胃增熱禁芩連梔栢
升柴
四因日內未曾服生化湯勿用參芪朮以致塊痛不
消
五毋用地黃以滯惡露
六毋用枳殼牛膝枳實以消塊
七便秘毋用大黃芒硝
八毋用蘇木稜蓬以行塊芍藥能伐氣不可用
九毋用山查湯以攻塊定痛而反損新血
十毋輕服濟坤丹以下胎下胞
產後危疾諸症當頻服生化湯隨症加減照依方論

產後寒熱

凡新產後榮衛俱虛易發寒熱身痛腹痛決不可妄投發散之劑當用生化湯爲主稍佐發散之藥產後脾虛易於停食以致身熱世人見有身熱便以爲外感遽然發汗速亡甚矣當於生化湯中加扶脾消食之藥大抵產後先宜補血次補氣若偏補氣而專用參芪非善也產後補虛用參芪芎歸白朮陳皮炙草熱輕則用茯苓淡滲之藥其熱自除重則加乾薑或云大熱而用薑何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛內生熱耳蓋乾薑能入肺分利肺氣又能入肝分引眾藥生血然必與陰血藥同用之產後惡寒發熱腹痛者當主惡血若腹不痛非惡血也

產後寒熱口眼歪邪此乃氣血虛甚以大補爲主左

手脈不足補血藥多於補氣藥右手脈不足補氣藥
多於補血藥切不可用小續命等發散之藥

胎前患傷寒疫症瘧疾墮胎等症

胎前或患傷寒疫症瘧疾熱久必致墮胎墮後愈增熱因熱消陰血而又繼產失血故也治者甚勿妄論傷寒瘧疫未除誤投梔子豉湯柴芩連柏等藥雖或往來潮熱大小便秘五苓承氣等藥斷不可用只重產輕邪大補氣血頻服生化湯如形脫氣脫加生脈散以防血暈蓋川芎味辛能散乾薑能除虛火雖有便秘煩渴等症只多服生化湯自津液生而二便通矣若熱用寒劑愈虛中氣誤甚

產後諸產治法

此症勿拘古方妄用蘇木蓬稜以輕人命其一應散血方破血藥俱禁用雖山查性緩亦能害命不可擅用惟生化湯係血塊聖藥也

生化湯原方

當歸八錢 川芎三錢 桃仁十四粒去皮尖研 黑薑五分 炙草五分 用黃酒童便各半煎服

又益母丸鹿角灰就用生化湯送下一錢外用烘熱衣服煖和塊痛處雖大暑亦要和煖塊痛處有氣不運而暈迷厥切不可妄說惡血搶心只服生化湯爲妙俗有生地牛膝行血山稜蓬朮敗血山查沙糖消塊蘄艾椒酒定痛反致昏暈等症切不可妄用二三四日內覺痛

肉桂一作三分

減可採乃虛痛也宜加參生化湯如七日內或因寒涼食物結塊痛甚者加入肉桂八分於生化湯內如血塊未消不可加參芪用之則痛不止總之慎勿用峻利藥勿多飲薑椒艾酒頻服生化湯行氣助血外用熱衣以煖腹如用紅花以行之蘇木牛膝以攻之則誤其胎氣脹用烏藥香附以順之枳殼厚樸以舒之甚有青皮枳實蘇子以下氣定喘芩連梔子黃栢以退熱除煩至於血結更甚反用承氣湯下之而愈結汗多小便短澀反用五苓散通之而愈秘非徒無益而又害之也

凡兒生下或停血不下半月外尚痛或外加腫毒高寸許或身熱減飲食倦甚必用生化湯加三稜蓬朮肉桂

等攻補兼治其塊自消如虛甚食少泄瀉只服此帖定痛且健脾胃進食止瀉然後服消塊湯

加味生化湯 治血塊日久不消半月後方可用之

川芎一錢 當歸三錢 肉薑四分 桃仁十五粒

三稜醋炒六分 元胡六分 肉桂六分 炙草四分

血暈第二

分娩之後眼見黑花頭眩昏暈不省人事者一因勞倦甚而氣竭神昏二因大脫血而氣欲絕三因痰火乘虛泛上而神不守當急服生化湯二三帖外用韮菜細切納有嘴瓶中用滚醋二鍾冲入瓶內急冲產母鼻中即醒若偏信古方認為惡血搶心而輕用散血之劑認為痰火而用無補消降之方誤甚矣

如暈厥牙關緊閉速煎生化湯挖開口將鵝毛探喉酒盞盛而灌之如灌下腹中漸溫煖不可拘帖數外用熱手在單衣上從心揉按至腹常熱火煖之一兩時服生化湯四帖完即神清始少煖藥方進粥服至十服而安故犯此者連灌藥火煖不可棄而不救若在冬月婦人身欠煖亦有大害臨産時必預煎生化湯預燒秤錘硬石子候兒下地速服二三帖又産婦枕邊行醋韭投醋瓶之法決無暈症又兒生時合家不可喜子而慢母産母不可顧子忘倦又不可産訖即卧或忿怒逆氣皆致血暈慎之慎之

加味生化湯 治産後三等血暈症

川芎三錢 當歸六錢 黑薑四分 桃仁十粒

炙草五分 荊芥炒黑四分 大棗水煎服

勞倦甚而暈及血崩氣脫而暈並宜速灌兩服如形色脫或汗出而脫皆急服一帖卽加人參三四錢一加肉桂四分决不可疑參爲補而緩服痰火乘虛泛上而暈方內加橘紅四分虛甚加人參二錢肥人多痰再加竹瀝七分薑汁少許總不可用稜朮破血等方其血塊痛甚兼送益母丸或鹿角灰或元胡散或獨勝散上消血塊方服一服卽效不必易方從權救急

加參生化湯 治產後形色脫暈或汗多脫暈

人參三錢有倍加至五錢者 川芎二錢 當歸五錢 炙草四分

桃仁十粒 炮薑四分 大棗水煎服

脉脫形脫將絕之症必服此方加參四五錢頻頻灌之產後血崩血暈兼汗多宜服此方無汗不脫只服本方不必加參左尺脉脫亦加參此方治產後危急諸症可通用一晝一夜必須服三四劑若照常症服豈能接將絕之氣血扶危急之變症耶產後一二日血塊痛雖未止產婦氣血虛脫或暈或厥或汗多或形脫口氣漸涼煩渴不止或氣喘急無論塊痛從權用加參生化湯病勢稍退又當減參且服生化湯

加減法血塊痛甚加肉桂七分渴加麥冬一錢五味十粒汗多加麻黃根一錢如血塊不痛加炙黃芪一錢以止汗傷飯食麪食加炒神麯一錢麥芽五分炒傷肉食加山查五個砂仁四錢炒

炮薑一作不薑

厥症第三

婦人產有用力過多勞倦傷脾故逆冷而厥氣上胸滿脈去形脫非大補不可豈錢數川芎當歸能回陽復神乎必用加參生化湯倍參進二劑則氣血旺而神自生矣厥自止矣若服藥而反渴另有生脈散獨參代茶飲救臟之燥如四肢逆冷又泄痢類傷寒陰症又難用四逆湯必用倍參生化湯加附子一片可以回陽止逆又可以行參歸之力立二方於左分先後

加參生化湯 治產後發厥塊痛未止不可加芪朮

川芎二錢　當歸四錢　炙草五分　炮薑四分

桃仁十粒去皮尖研　人參二錢　棗　水煎進二服

滋榮益氣復神湯 治產後發厥問塊痛已除可服此方

人參三錢 黃芪一錢蜜炙 白朮一錢土炒 當歸三錢
炙草四分 陳皮四分 五味十粒 川芎一錢
熟地一錢 麥芽一錢 棗一枚水煎服
手足冷加附子五分汗多加麻黃根一錢熟棗仁一錢妄言妄見加益智柏子仁龍眼肉大便實加肉蓯蓉二錢大抵產後暈厥二症相類但暈在臨盆症急甚於厥宜頻服生化湯幾帖塊化血旺神清暈止若多氣促形脫等症必加參芪厥在分娩之後宜倍參生化湯止厥以復神並補氣血也非如上偏補氣血而可愈也要知暈有塊痛芪朮不可加厥症若無塊痛芪朮地黃並用無疑也

血崩第四

凡止崩用荊芥俱宜炒黑

産後血大來審血色之紅紫視形色之虛實如血紫有塊乃當去其敗血也止留作痛不可論崩如鮮紅之血乃是驚傷心不能生血怒傷肝不能藏血勞傷脾不能統血俱不能歸經耳當以崩治先服生化湯幾帖則行中自有補若形脫汗多氣促宜服倍參生化湯幾帖以益氣非棕灰之可止者如産後半月外崩又宜升舉大補湯治之此症虛極服藥平穩未見速效須二十帖後諸症頓除

生血止崩湯 治産後血崩

川芎一錢 當歸四錢 黑薑四分 炙草五分

桃仁十粒 荊芥五分炒黑 烏梅五分煅灰 蒲黃五分炒

棗水煎 忌薑椒熱物生冷

症係虛極註中有身熱不可加連柏云云後三頁復神湯項下註有宜用此湯少佐黃連降火云云設無火可驗此方內並無熱藥無須反佐甚覺連朮可輕用此處最宜詳慎又註中寒嗽加有知母既係寒嗽知母亦未可擅用

鮮紅血大來荆芥穗炒黑白芷各五分血竭形敗加參三四錢汗多氣促亦加參三四錢無汗形不脫氣促只服生化湯多服則血自平有言歸芎但能活血甚誤

升舉大補湯 滋榮益氣加有塊動只服前方芪朮勿用

黃芪 白朮 陳皮各四分 人參二錢 炙草 升麻各四分 當歸 熟地各二錢 麥冬一錢 川芎一錢 白芷四分 黃連炒三分 荆芥穗炒黑四分

汗多加麻黃根一錢浮麥炒一小撮大便不通加肉蓯蓉一錢禁用大黃氣滯磨木香三分痰加貝母六分竹瀝薑汁少許寒嗽加杏仁十粒桔梗五分知母一錢驚加棗仁柏子仁各一錢傷飯加神麯麥芽各

此條疑原刊寒字在

一錢傷肉食加山查砂仁各八分俱加棗水煎身熱不可加連柏傷食怒氣均不可專用耗散無補藥凡年老虛人患崩宜升舉大補湯

按症虛極註中有身熱不可加連柏云云後三頁復神湯項下註有宜用此湯少佐黃連墜火云云設無火可墜此方內並無熱藥無須反佐恐黃連未可輕用此處最宜詳愼

又註中寒嗽加有知母既係寒嗽知母亦未可擅用此條疑原刊寒字有誤

氣短似喘第五

因血脫勞甚氣無所恃呼吸止息違其常度有認爲痰火反用散氣化痰之方誤人性命當以大補血爲主如

黃芪白朮一作各二錢

凡止汗用浮麥宜炒

有塊不可用參芪朮無塊方可用本方去桃仁加熟地並附子一片足冷加熟附子一錢及參朮陳皮接續補氣養榮湯

加參生化湯 治分娩後即患氣短者有塊不可用芪朮

川芎三錢 當歸四錢 炙草五分 黑薑四分

桃仁十粒去皮尖研 人參二錢 引加棗一枚連進二三帖後再用後方

補氣養榮湯 治產後氣短促血塊不痛宜服此方

黃芪一錢 白朮一錢 當歸四錢 人參三錢

陳皮四分 炙草四分 熟地二錢 川芎二錢

黑薑四分 如手足冷加熟附子一錢 汗多加麻黃根一錢 浮麥一小撮 渴加麥冬一錢 五味子十粒 大便

不過加肉蓯蓉一錢麻仁一撮傷麪飯加炒神麯一錢炒麥芽一錢傷肉食加山查砂仁各五分

按麥芽有回乳之害用者慎之

妄言妄見第六

由氣血虛神魂無依也治當論塊痛有無緩急若塊痛未除先服生化湯二三帖痛止繼服加參生化湯或補中益氣湯加安神定志丸調服之若產日久形氣俱不足即當大補氣血安神定志服至藥力充足其病自愈勿謂邪祟若噴以法水驚之每至不救屢治此症服藥至十數帖方效病虛似邪欲除其邪先補其虛先調其氣次論諸病此古人治產後虛症及年老虛喘弱人妄言所當用心也

安神主化湯（治産後塊痛未止妄言妄見症未可用芪朮）

川芎一錢 柏子仁一錢 人參一二錢 當歸二三錢

茯神二錢 桃仁十二粒 黑薑四分 炙草四分

益智炒八分 陳皮三分

棗水煎

滋榮益氣復神湯（塊痛已止妄言妄見服此方即愈）

黃芪 白朮 麥冬 川芎 柏子仁 茯神

益智各一錢 人參 熟地各二錢 陳皮三分

炙草四分 棗仁二十粒一錢 五味子十粒 蓮子八枚

元肉八个 棗水煎服

産後血崩血脫氣喘氣脫神脫妄言雖有血氣陰陽之分其精散神去一也比暈後少緩亦危症也若非

厚藥頻服失之者多矣誤論氣實痰火者非也新產有血塊痛並用加參生化湯行中有補斯免滯血血暈之失也其塊痛止有宜用升舉大補湯少佐黃連墜火以治血脫安血歸經也有宜用倍參補中益氣湯少佐附子助參以治氣脫攝氣歸淵也有宜用滋榮益氣復神湯少佐痰劑以清心火安君主之官也

傷食第七

新產後禁膏粱遠厚味如飲食不節必傷脾胃治當扶元溫補氣血健脾胃審傷何物加以消導諸藥生化湯加神麯麥芽以消麪食加山查砂仁以消肉食如寒冷之物加吳茱肉桂如產母虛甚加人參白术又有塊然後消補並治無有不安者屢見治者不重產後之弱惟

知速消傷物反損真氣益增滿悶可不慎哉

加味生化湯 治血塊未消服此以消食

川芎二錢 當歸五錢 黑薑四分 炙草五分 桃仁十粒

問傷何物加法如前煎服

健脾消食生化湯 治血塊已除服此消食

川芎一錢 人參 當歸各二錢 白朮一錢半

炙草五分

審傷何物加法如前

如停寒物日久脾胃虛弱恐藥不能運用可用揉按

炒神麴熨之更妙凡傷食誤用消導藥反絕粥幾日

者宜服此方

長生活命丹

人參三錢水一鍾半煎半鍾先用參湯一盞以米飯鍋焦研粉三匙漸漸加參湯鍋焦粉引開胃口煎參湯用新罐或銅杓恐閙藥氣要嘔也如服寒藥傷者加薑三大片煎湯人參名活命草鍋焦名活命丹此方曾活數十人

忿怒第八

產後怒氣逆胸膈不利血塊又痛宜用生化湯去桃仁服時磨木香二分在內則塊化怒散不相悖也若輕產重氣偏用木香烏藥枳殼砂仁之類則元氣反損益增滿悶又加怒後即食胃弱停悶當審何物治法如前愼勿用木香檳榔丸流氣引子之方使虛弱愈甚也

木香生化湯 治產後血塊已除因受氣者

陳皮一作三分又有炙草四分存參

川芎二錢當歸六錢陳皮三分黑薑四分服時磨木香二分在內此方減桃仁用木香陳皮前有減乾薑者詳之

健脾化食散氣湯 治受氣傷食無塊痛者

白朮二錢當歸二錢川芎一錢黑薑四分人參二錢陳皮三錢

審傷何物加法如前大抵產後忿怒氣逆及停食二症善治者重產而輕怒氣消食必以補氣血為先佐以調肝順氣則怒鬱散而元不損佐以健脾消導則停食行而思穀矣若偏理氣消食非徒無益而又害之

類瘧第九

産後寒熱往來每日應期而發其症似瘧而不可作瘧治夫氣血虛而寒熱更作元氣虛而外邪或侵或嚴寒或極熱或晝輕夜重或日晡寒熱絕類瘧症治當滋榮益氣以退寒熱有汗急宜止或加麻黃根之類只頭有汗而不及於足乃孤陽絕陰之危症當加地黃當歸之類如陽明無惡寒頭痛無汗且與生化湯加羌活防風連鬚葱白數根以散之其柴胡清汗飲等方常山草菓等藥俱不可用

滋榮養氣扶正湯 治産後寒熱有汗午後應期發者

人參二錢 炙黃芪 白朮 川芎 熟地

麥冬 麻黃根各一錢 當歸三錢 陳皮四分

炙草五分 棗水煎

加減養胃湯治產後寒熱往來頭痛無汗類瘧者

炙草四分 白茯苓一錢 半夏製八分 川芎一錢

陳皮四分 當歸二錢 蒼朮一錢 藿香四分

人參一錢

薑引煎服有痰加竹瀝薑汁半夏神麯弱人兼服河車丸凡久瘧不愈兼服參朮膏以助藥力

參朮膏

白朮一斤米泔浸一宿剉焙 人參一兩 用水六碗煎二碗再煎二次其汁六碗合在一處將藥汁又熬成一碗空心米湯化半酒盞

類傷寒二陽症第十

產後七日內發熱頭痛惡寒毋專論傷寒為太陽症發

一本無桃仁有黑薑四分

熱頭痛脇痛毋専論傷寒為少陽症二症皆由氣血兩虛陰陽不和而類外感治者慎勿輕產後熱門而用麻黃湯以治類太陽症又勿用柴胡湯以治類少陽症且產母脫血之後而重発其汗虛虛之禍可勝言哉昔仲景云亡血家不可発汗丹溪云產後切不可發表二先生非謂產後真無傷寒之兼症也非謂麻黃湯柴胡湯之不可對症也誠恐後輩學業偏門而輕產執成方而發表耳誰知產後真感風感寒生化中芎薑亦能散之乎

加味生化湯 治產後三日內発熱頭痛定

川芎 防風各一錢 當歸三錢 炙草四分

桃仁十粒 羌活四分

查刊本去桃仁，然必須問有塊痛與否，方可議去。服二帖後，頭仍痛，身仍熱，加白芷八分、細辛四分。如發熱不退，頭痛如故，加連鬚葱五个、人參三錢。産後敗血不散，亦能作寒作熱，何以辨之？曰：時有刺痛者，敗血也；但寒熱無他症者，陰陽不和也。刺痛用當歸，乃和血之藥；若乃積血而刺痛者，宜用紅花、桃仁、歸尾之類。

類傷寒三陰症第十一

潮熱有汗，大便不通，毋專論爲陽明症；口燥咽乾而渴，毋專論爲少陰症；腹滿液乾，大便實，毋專論爲太陰症；又汗出譫語便閉，毋專論爲腸胃中燥糞宜下症。數症多由勞倦傷脾，運化稽遲，氣血枯槁，腸腑燥涸，乃虛症

類實當補之症治者勿執偏門輕產而妄議三承氣湯以治類三陰之症也間有少壯產後妄下幸而無妨虛弱產婦亦復妄下多致不救屢見妄下成膨誤導反結又有血少數日不通而即下致瀉不止者危哉婦人良方云產後大便秘若計其日期飯食數多即用藥通之禍在反掌必待腹滿覺脹欲去不能者反結在直腸宜用豬胆汁潤之若日期雖久飲食如常腹中如故只用補劑而已若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞滿誤矣

養正通幽湯 治產後大便秘結類傷寒三陰症

川芎二錢半　當歸六錢　炙草五分　桃仁十五粒
麻仁炒二錢　肉蓯蓉酒洗去甲一錢　汗多便實加黃芪

一錢麻黄根一錢人參二錢口燥渴加人參麥冬各
錢腹滿溢便實加麥冬一錢枳殼六分人參二錢
茯苓一錢汗出譫語便實乃氣血虚竭精神失守宜
養榮安神加茯神遠志茯苓各一錢人參白术各二錢
黄芪白芷各一錢栢子仁一錢
以上數等大便燥結症非用當歸人參至斤數難取
功效大抵産後虚中傷寒口傷食物外症雖見頭痛
發熱或脇痛腰痛是外感宜汗猶當重産亡血禁汗
惟宜生化湯量爲加減調理無失又如大便秘結猶
當重産亡血禁下宜養正助血通滯則穩當矣
又潤腸粥 治産後日久大便不通
芝麻一升研末和米二合煮粥食腸潤即通

類中風第十二

產後氣血暴虛百骸少血濡養忽然口噤牙緊手足筋脉拘搐等症類中風癎瘛雖虛火泛上有痰皆當以末治之勿執偏門而用治風消痰之方以重虛產婦也治法當先服生化湯以生旺新血如見危症三服後即用加參益氣以救血脫也如有痰火少佐橘紅炒芩之類竹瀝薑汁亦可加之黃柏黃連切不可並用愼之

滋榮活絡湯 治產後血少口噤項強筋搐類風症

川芎一錢半 當歸 熟地 人參各二錢 黃芪

茯神 天麻各一錢 炙草 陳皮 荊芥穗

防風 羌活各四分 黃連八分薑汁炒 有痰加竹瀝

薑汁半夏渴加麥冬葛根有食加山查砂仁以消肉

一本棗仁用一錢炒研下用四分人參

食神麯麥芽以消飯食大便閉加肉蓯蓉一錢半汗多加麻黃根一錢驚悸加棗仁一錢

天麻丸 治産後中風恍惚語澁四肢不利

天麻一錢 防風一錢 川芎七分 羌活七分 人參 遠志 柏子仁 山藥 麥冬各一錢 棗仁一兩 細辛一錢 南星麯八分 石菖蒲一錢 研細末煉蜜爲丸辰砂爲衣淸湯下六七十丸

類痙第十三

産後汗多卽變痙者項強而身反氣息如絕宜速服加減生化湯

加減生化湯 專治有汗變痙者

川芎 麻黃根各一錢 當歸四錢 桂枝五分

人參一錢 炙草五分 羌活五分 天麻八分
附子一片 羚羊角八分
如無汗類痓者中風用川芎三錢 當歸洗一兩酒
棗仁 防風俱無分量

出汗第十四

凡分娩時汗出由勞傷脾驚傷心恐傷肝也產婦多兼三者而汗出不可卽用斂汗之劑神定而汗自止若血塊作痛芪朮未可遽加宜服生化湯二三帖以消塊痛隨繼服加參生化湯以止虛汗若分娩後倦甚濈濈然汗出形色又脫乃亡陽脫汗也汗本亡陽陽亡則陰隨之故又當從權速灌加參生化湯倍參以救危毋拘塊痛婦人產多汗當健脾以斂水液之精益榮衛以噓血

歸源灌溉四肢不使妄行雜症雖有自汗盜汗之分然當歸六黃湯不可治產後之盜汗也並宜服加參生化湯及加味補中益氣二方若服參芪而汗多不止及頭出汗而不至腰足必難療矣如汗出而手拭不及者不治產後汗出氣喘等症虛之極也不受補者不治

麻黃根湯 治產後虛汗不止

人參二錢 當歸二錢 黃芪一錢半炙 白朮一錢炒 桂枝五分 麻黃根一錢 粉草五分炒 牡蠣研少許 浮麥大撮

虛脫汗多手足冷加黑薑四分熟附子一片渴加麥冬一錢五味十粒肥白人產後多汗加竹瀝一盞薑汁一小匙以清痰火惡風寒加防風桂枝各五分血

愧不落加熟地三錢晚服八味地黄丸
山茱萸　山藥　丹皮　雲苓各八錢　澤瀉五錢
熟地八錢　五味子五錢　炙黄芪一兩
煉蜜爲丸陽加於陰則汗因而遇風變爲痓症者有之尤難治故汗多宜謹避風寒汗多小便不通乃亡津液故也勿用利水藥

盜汗第十五

産後睡中汗出醒來即止猶盜瞰人睡而謂之盜汗非汗自至之比雜症論云自汗陽虧盜汗陰虚然當歸六黄湯又非産後盜汗方也惟兼氣血而調治之乃爲得耳

止汗散治産後盜汗

人參二錢 當歸二錢 熟地一錢半 麻黃根五分
黃連五分酒炒 浮小麥一大撮 棗一枚

又方

牡蠣煅細末五分 小麥麩炒黃研末

一本牡蠣小麥炒黃各五分空心調服

口渴兼小便不利第十六

產後煩燥咽乾而渴兼小便不利由失血汗多所致治當助脾益肺升舉氣血則陽升陰降水入經而爲血爲液穀入胃而氣長脉行自然津液生而便調利矣若認口渴爲火而用芩連梔柏以降之認小便不利爲水滯而用五苓散以通之皆失治也必因其勞損而溫之益之因其留滯而濡之行之則庶幾矣

生津止渴益水飲

人參　麥冬　當歸　生地各三錢　黃芪三錢

葛根一錢　升麻　炙草各四分　茯苓八分

五味子十五粒

汗多加麻黃根一錢浮小麥一大撮大便燥加肉蓯蓉一錢五分渴甚加生脉散不可疑而不用

遺尿第十七

氣血太虛不能約束宜八珍湯加升麻柴胡甚者加熟附子一片

產後編上終

產後編下卷目錄

乳瘋

風甚

不語

補編

大便不通

雞爪風

浮腫



胞破女科上卷另有方較妥且效

產後編下

陽曲傅　山青主手著

誤破尿胞第十八

產理不順穩婆不精誤破尿胞膀胱者用參芪為君歸芎為臣桃仁陳皮茯苓為佐豬羊尿胞煎藥百服乃安又方云用生黃絲絹一尺白牡丹皮根為末白芨末各二錢水二碗煮至絹爛如餳服之宜靜臥不可作聲名補脬飲神效

患淋第十九

由產後虛弱熱客於脬中內虛頻數熱則小便淋澀作痛曰淋

茅根湯凡產後冷熱淋並治之

一本小註載症由內虛方用石膏一兩無此治法不可拘執隨方以致誤人 一本石膏作一錢無滑石一作各等分

石膏一兩 白茅根一兩 瞿麥 白茯苓各五錢

葵子 人參 桃膠 滑石各一錢 石首魚頭四個

燈心水煎入齒末空心服

又方治產後小便痛淋血

白茅根 瞿麥 葵子 車前子 通草以上無分量

鯉魚齒一百個 水煎服亦入齒末

按齒末疑均是鯉魚齒

便數第二十

由脬內素有冷氣因產發動冷氣入脬故也用赤石脂二兩爲末空心服

又方治小便數及遺尿用益智仁二十八枚爲末米飲送下二錢

又桑螵散

桑螵蛸三十個　人參　黃芪　鹿茸　牡蠣

赤石脂各三錢為末空心服二錢米飲送下

瀉第二十一

產後泄瀉非雜症有食泄溼泄水穀注下之論大率氣虛食積與溼也氣虛宜補食積宜消溼則宜燥然惡露未淨遽難驟燥當先服生化湯二三帖化舊生新加茯苓以利水道俟血生然後補氣以消食燥溼以分利水道使無滯澁虛虛之失若產旬日外方論雜症尤當論虛實而治也如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞水黃赤肛門作痛以熱泄治之有因飲食過多傷脾成泄氣臭如敗卵以食積治之又有脾氣久虛少食

食下即嘔急噫下所食之物方覺快者以虛寒泄治之治法寒則溫之熱則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛實爲調治無失也產後虛瀉眠昏人不識弱甚形脫危症必用人參二錢白朮茯苓各二錢附子一錢方能回生若脈浮弦按之不鼓即爲中寒此蓋陰先亡而陽欲去速宜大補氣血加附子黑薑以回元陽萬勿忽視

加減生化湯 治產後塊未消患瀉症

川芎二錢　茯苓二錢　當歸四錢　黑薑五分
炙草五分　桃仁十粒　蓮子八枚　水煎溫服

健脾利水生化湯 治產後塊已除患瀉症

川芎一錢　茯苓一錢半　歸身二錢　黑薑四分
陳皮五分　炙草五分　人參三錢　肉果一個製

白朮土炒一錢澤瀉八分

寒瀉加乾薑八分寒痛加砂仁炮薑各八分熱瀉加連八分渴水腹痛米飲不化加砂仁八分麥芽山查各一錢瀉有酸噯臭氣加神麴砂仁各八分脾氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮一錢以燥溼脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱邪寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮苓附必用之藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒

完穀不化第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也名飧泄又飲食太過脾胃受傷亦然俗呼水穀痢是也然產方三日內塊未消化此脾胃衰弱參芪朮未可遽加且服生化湯加益

一本當歸作三錢有棗一枚

一本有蓮子八枚去心棗三枚

智香砂少溫脾氣俟塊消後加參芪朮補氣肉果木香砂仁益智溫胃升麻柴胡清胃氣澤瀉茯苓陳皮以利水為上策也

加味生化湯 治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎一錢 益智一錢 當歸四錢 黑薑四分

炙草四分 桃仁十粒 茯苓一錢半

參苓生化湯 治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱患此症者

川芎一錢 當歸二錢 黑薑四分 炙草五分

人參二錢 茯苓一錢 白芍炒一錢 益智炒一錢

白朮土炒二錢 肉果一個製

瀉水多加澤瀉木通各八分腹痛加砂仁八分渴加麥冬五味子寒瀉加黑薑一錢木香四分食積加

麴蘗芽消飯麪砂仁山查消肉食產後瀉痢日久胃氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣六君子湯加木香四分肉果一個製

痢第二十三

產後七日內外患赤白痢裏急後重頻併最爲難治欲調氣行血而推蕩痢邪猶患產後元氣虛弱欲滋榮益氣而大補虛弱又助痢之邪惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓則善消惡露而兼治痢疾並行而不相悖也再服香連丸以俟一二日後病勢如減可保無虞若產七日外有患褐花色後重頻併虛痢即當加補無疑若產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連芩厚朴芍藥行積之劑

加減生化湯 治產後七日內患痢

川芎二錢 當歸五錢 炙草五分 桃仁廿一粒

茯苓一錢 陳皮四分 木香磨三分

紅痢腹痛加砂仁八分

青血丸 治禁口痢

香連爲末加蓮肉粉各一兩半和勻爲丸酒送下四錢

凡產三四日後塊散痢疾少減共十症開後依治

一產後久瀉

元氣下陷大便不禁肛門如脫宜服六君子湯加木香四分肉果一個製薑汁五分

二產後瀉痢

一木 神麯 麥芽下有 各一錢

色黃乃脾土眞氣虛損宜服補中益氣湯加木香肉果

三產後傷麵食

瀉痢宜服生化湯加神麯麥芽

四產後傷肉食

瀉痢宜服生化湯加山查砂仁

五產後胃氣虛弱

瀉痢完穀不化當溫助胃氣宜服六君子湯加木香四分肉果一個製

六產後脾胃虛弱

四肢浮腫宜服六君子湯加五皮散見後水腫

七產後瀉痢

無后重但久不止宜服六君子湯加木香肉果

八產後赤白痢

臍下痛當歸厚樸黃連肉果甘草桃仁川芎

九產後久痢

色白屬血虛宜四物湯加荆芥人參

十產後久痢

色赤屬氣虛宜六君子湯加木香肉果

霍亂第二十四

由勞傷氣血臟腑空虛不能運化食物及感冷風所致陰陽升降不順清濁亂於脾胃冷熱不調邪正相搏上下爲霍亂

生化六和湯 治產後血塊痛未除患霍亂

川芎二錢 當歸四錢 黑薑 炙草 陳皮
藿香各四分 砂仁六分 茯苓一錢 薑三片煎

附子散 治產後霍亂吐瀉手足逆冷須無塊痛方可服

白朮一錢 當歸二錢 陳皮 黑薑 丁香
甘草各四分
共爲末粥飲送下二錢

溫中湯 治產後霍亂吐瀉不止無塊痛者可服

人參一錢 白朮一錢半 當歸二錢 厚樸八分
黑薑四分 茯苓一錢 草豆蔻六分
薑三片水煎服

嘔逆不食第二十五

產後勞傷臟腑寒邪易乘於腸胃則氣逆嘔吐而不下

一本有白术無白茯

食也又有瘀血未淨而嘔者亦有穢氣入胃胃口不清而嘔者當隨症調之

加減生化湯 治産婦嘔逆不食

川芎一錢 當歸三錢 黑薑 砂仁 霍香各五分 淡竹葉七片

水煎和薑汁二匙服

溫胃丁香散 治産後七日外嘔逆不食

當歸三錢 白朮二錢 黑薑四分 丁香四分

人參一錢 陳皮五分 炙草五分 前胡五分

霍香五分 薑三片 水煎服

石蓮散 治産婦心沖目眩

石蓮子一兩半去殼去心 白茯苓一兩 丁香五分

一本作竹朮黑白伏苓丁可作五用者酌之

一本人參一錢麥冬伏苓三存參

一本分

共爲細末米飲送下

生津益液湯 治産後血虛弱口渴氣少由産後血少多汗內煩不生津液

人參 麥冬去心 茯苓各一兩 大棗 竹葉

浮小麥 炙草 括蔞根 大渴不止加蘆根

咳嗽第二十六

治産後七日內外感風寒咳嗽鼻塞聲重惡寒勿用麻黄以動汗嗽而脇痛勿用柴胡湯嗽而有聲痰少而赤勿用涼藥凡産有火嗽有痰嗽必須調理半月後方可用涼藥半月前不當用

加味生化湯 治産後外感風寒咳嗽及鼻塞聲重

川芎一錢 當歸二錢 杏仁十粒 桔梗四分

知母八分

有痰加半夏麴虛弱有汗咳嗽加人參總之產後不可發汗

加參安肺生化湯 治產後虛弱旬日內外感風寒咳嗽聲重有痰或身熱頭痛及汗多者

川芎一錢 人參一錢 知母一錢 桑白皮一錢

當歸二錢 杏仁十粒去皮尖 甘草四分 桔梗四分

半夏七分 橘紅三分

虛人多痰加竹瀝一杯薑汁半匙

按咳嗽論中明示縱有火嗽在半月前猶不得輕用涼藥並戒綦嚴而第一與第二方中均有知母小註均有外感風寒云云此必於既感之後將蘊而為熱不得已而用之小註未及申明如謂不然當初感即用此涼品豈不與前論顯為枘鑿讀者須會前人微意庶不致用古方而門少權衡耳

加味四物湯治半月後乾嗽有聲痰少者

川芎 白芍 知母 瓜蔞仁各一錢 生地

當歸各二錢 訶子二錢 冬花六分 桔梗四分

甘草四分 兜鈴四分 生薑一大片

水腫第二十七

產後水氣手足浮腫皮膚見光榮色乃脾虛不能制水腎虛不能行水也必以大補氣血爲先佐以蒼朮白朮茯苓補脾壅滿用陳皮半夏香附消之虛人加人參木通有熱加黃芩麥冬以清肺金健脾利水補中益氣湯七日外用人參白朮各二錢茯苓白芍各一錢陳皮五分木瓜八分紫蘇木通大腹皮蒼朮厚樸各四分大便不通加郁李仁麻仁各一錢如因寒邪濕氣傷脾無汗

此方能調經治腹痛

面腫宜薑皮半夏蘇葉加於補氣方以表汗

五皮散 治產後風溼各傷脾經氣血凝滯以致面目浮虛四肢腫脹氣喘

五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮各一錢

薑皮一錢 棗一枚水煎服

又云產後惡露不淨停留脈絡致令浮腫若以水氣治之投以甘遂等藥誤矣但服調經散則血行而腫消矣

調經散

沒藥另研 琥珀另研各一錢 肉桂 赤芍

當歸各一錢

右為細末每服五分薑汁酒各少許調服

流注第二十八

產後惡露流於腰臂足關節之處或漫腫或結塊久則

腫起作痛敗體倦怠急宜用葱熨法以治外腫內服參歸生化湯以消血滯無緩也未成者消已成者潰

葱熨法

用葱一握炙熱搗爛作餅敷痛處用厚布二三層以熨斗火熨之

參歸生化湯

川芎一錢半 當歸二錢 炙草五分 人參二錢
黃芪一錢半 肉桂五分 馬蹄香二錢

此症若不補氣血節飲食慎起居未有得生者如腫起作痛起居飲食如常是病氣未深形氣未損易治若漫腫微痛起居倦怠飲食不足最難治或未成膿未潰氣血虛也宜服八珍湯增寒惡寒陽氣虛也宜

服十全大補湯補後大熱陰血虛也宜服四物湯加參朮丹皮嘔逆胃氣虛也宜服六君子湯加炮薑乾薑食少體倦脾氣虛也宜服補中益氣湯四肢冷逆小便頻數腎氣虛也補中益氣湯加益智仁一錢神仙迴洞散治産後流注惡露日久成腫用此宜導其膿若未補氣血旺不可服此方

膨脹第二十九

婦人素弱臨產又勞中氣不足胸膈不利而轉運稽遲若産後即服生化湯以消塊止痛又服加參生化湯以健脾胃自無中滿之症其膨脹因傷食而誤消因氣鬱而誤散多食冷物而停留惡露又因血虛大便燥結誤下而愈脹殊不知氣血兩虛血塊消後當大補氣血以

一本人參白朮各一錢當歸作二錢[illegible]一分一本人參白朮作二錢

補中處治者若但知傷食宜消氣鬱宜散惡露當攻便結可下則胃氣反損滿悶益增氣不升降溼熱積久遂成膨脹豈知消導坐於補中則脾胃强而所傷食氣消散助血兼行大便自通惡露自行

如產後中風氣不足微滿誤服耗氣藥而脹者服補中益氣湯

人參五分　當歸五分　白朮五分　白茯苓一錢

川芎四分　白芍四分　蘿蔔子四分　木香三分

如傷食誤服消導藥成脹或脇下積塊宜服健脾湯

人參　白朮　當歸各三錢　白茯苓　白芍

神麯　吳萸各一錢　大腹皮　陳皮各四分

砂仁　麥芽各五分

一本無桃仁

如大便不通誤服下藥成脹及腹中作痛宜服養榮生化湯

當歸四錢　白芍一錢　白茯苓一錢　人參二錢

白术二錢　陳皮五分　大腹皮五分　香附五分

蓰蓉一錢　桃仁十粒製

𡍼痛將藥送四消丸屢誤下須用參歸半斤大便方通膨脹方退凡誤用消食耗氣藥以致絕穀長生活命丹屢效方見傷食條

怔忡驚悸第三十

由產憂驚勞倦去血過多則心中跳動不安謂之怔悸若惕然震驚心中怯怯如人將捕之狀謂之驚悸治此二症惟調和脾胃志定神清而病愈矣如分娩後血塊

未消宜服生化湯且補血行塊血旺則怔定驚平不必加安神定志劑如塊消痛止後患此宜服加減養榮湯

當歸二三錢 川芎二錢 茯神一錢 人參一錢

棗仁一錢炒 麥冬一錢 遠志一錢 白朮一錢

黃芪炙一錢 元肉八枚 陳皮四分 炙草四分

薑煎虛煩加竹瀝薑汁去川芎麥冬再加竹茹一團

加木香即歸脾湯

養心湯 治產後心血不定心神不安

炙黃芪一錢 茯神八分 川芎八分 當歸二錢

麥冬一錢八分 遠志八分 柏子仁一錢 人參一錢半

炙草四分 五味十粒 薑水煎服

骨蒸第三十

宜服保眞湯先服清骨散

柴胡梅連湯即清骨散作湯速效

柴胡　前胡　黃連　烏梅去核

各二兩共爲末聽用再將豬脊骨一條豬苦胆一個韮菜白十根各一寸同搗成泥入童便一酒盞攪和稀糊入藥末再搗爲丸如菉豆大每服三四十丸清湯送下如上膈熱多食後服此方凡男女骨蒸皆可用之不專治産婦

保眞湯

黃芪六分　人參二錢　白朮炒二錢　炙甘草四分

川芎六分　當歸二錢　天冬一錢　麥冬二錢

白芍二錢　枸杞二錢　黃連炒六分　黃栢炒六分

三本無麥冬黃連

一本麥冬石斛俱作八錢柴胡[illegible]錢黃柏[illegible]酒炒

知母二錢 生地二錢 五味十粒 地骨皮六分

棗三枚去核水煎服

加味大造湯 治骨蒸勞熱若服清骨散鄭連丸不效服此方

人參一兩 當歸一兩 麥冬八分 石斛八分酒蒸

柴胡六錢 生地二兩 胡連五錢 山藥一兩

枸杞一兩 黃柏炒七分

先將麥冬地黃搗爛後入諸藥同搗爲丸加蒸紫河車另搗焙乾爲末煉蜜丸

心痛第三十二

此劑胃脘痛因胃脘在心之下勞傷風寒及食冷物而作痛俗呼爲心痛心可痛乎血不足則怔忡驚悸不安耳若眞心痛手足青黑色旦夕死矣治當散胃中之寒

兼消胃中之冷物必用生化湯佐消寒食之藥無有不安若綿綿而痛可按、一之間無血塊則當論虛而加補也產後心痛腹痛二症相似因寒食與氣上攻於心則心痛下攻於腹則腹痛均用生化湯加肉桂吳萸等溫散之藥也

加味生化湯

川芎一錢 當歸三錢 黑薑五分 肉桂八分

吳萸八分 砂仁八分 炙草五分

傷寒食加肉桂吳萸傷麵食加神麯麥芽傷肉食加山查砂仁大便不通加肉蓯蓉

腹痛第二十三

先問有塊無塊塊痛只服生化湯調失笑散二錢加元

胡一錢無塊則是遇氣冷作痛宜服加減生化湯

川芎一錢 當歸四錢 黑薑四分 炙草四分

防風七分 吳萸六分 白蔻五分 桂枝七分

痛止去之隨傷食物所加如前

小腹痛第三十四

產後虛中感寒飲冷其寒下攻小腹作痛又有血塊作痛者又產後血虛臍下痛者並治之以加減生化湯

川芎一錢 當歸三錢 黑薑四分 炙草四分

桃仁十粒

有塊痛者本方中送前胡散亦治寒痛若無塊但小腹痛亦可按而少止者屬血虛加熟地三錢前胡肉桂各一錢為末名前胡散

一本有或無豬腎一個先將腎煮熟後再用湯煮藥

虛勞第三十五

指節冷痛頭汗不止

人參三錢 當歸三錢 黃芪二錢 淡豆豉十粒
生薑三片 韭白十寸 豬腎二個

先將豬腎煮熟取汁煎藥八分溫服

遍身疼痛第三十六

產後百節開張血脉流散氣弱則經絡間血多阻滯累日不散則筋牽脉引骨節不利故腰背不能轉側手足不能動履或身熱頭痛若誤作傷寒發表出汗則筋脉動蕩手足發冷變症出焉宜服趁痛散

當歸一錢 甘草 黃芪 白朮 獨活各八分
肉桂八分 桑寄生一錢 牛膝八分 薤白五根

一本無桑寄生

一本有川芎八分

胡桃一本作二十個

薑三片水煎服

腰痛 第三十七

由女人腎位繫胞腰爲腎腑產後勞傷腎氣損動胞絡或虛未復而風乘之也

養榮壯腎湯 治產後感風寒腰痛不可轉

當歸二錢 防風四分 獨活 桂心 杜仲 續斷 桑寄生各八分

生薑三片水煎服兩帖後痛未止屬腎虛加熟地三錢

加味大造丸 治產後日久氣血兩虛腰痛腎弱方見骨蒸條

青蛾丸

胡桃十二個 破故紙八兩酒浸炒 杜仲一斤薑汁炒去絲

一本山萸二錢當歸三錢五味十粒黃芪八分川芎六分熟地錢牛木瓜白朮各錢獨活八分棗仁一錢薑一片無山藥存參

為細末煉蜜丸淡醋湯送六十

脇痛第三十八

乃肝經血虛氣滯之故氣滯用四君子湯加青皮柴胡血虛用四物湯加柴胡人參白朮若概用香燥之藥則反傷清和之氣無所生矣

補肺散 治脇痛

山萸 當歸 五味 山藥 黃芪 川芎
熟地 木瓜 白朮 獨活 棗仁 各等分

水煎服

陰痛第三十九

產後起居太早產門感風作痛衣被難近身體宜用祛風定痛湯

川芎一錢　當歸三錢　獨活　防風　肉桂
荊芥炒黑各五分　茯苓一錢　地黄二錢
棗二枚煎服

又附陰瘡陰蝕陰中瘡曰𧏾瘡或痛或癢如蟲行狀濃汁淋漓陰蝕幾盡者由心腎煩鬱胃氣虛弱致氣血流滯經云諸瘡痛癢皆屬於心治當補心養腎外以藥煎洗宜用十全陰疳散

川芎　當歸　白芍　地榆　甘草各等分

水五碗煎三碗去渣薰日三夜四先薰後洗

一方用蒲黄一升水銀二兩二味調勻搽

一方用蝦蟆兎糞等分爲末敷瘡

一方治疳蟲食下部及五臟取東南桃枝輕打頭散以

綿纏之

一方用石硫黃末將縛桃枝蘸而燃烟薰之（按此條宜與上條合看）

一方截一短竹筒先納陰中以桃枝燒煙薰之

惡露第四十

即係裹兒污血產時惡露隨下則腹不痛而產自安若腹欠温煖或傷冷物以致惡露凝塊日久不散則虛症百出或身熱骨蒸食少羸瘦或五心煩熱月水不行其塊在兩脇動則雷鳴嘈雜暈眩發熱似瘧時作時止如此數症治者欲洩其邪先補其虛必用補中益氣湯送三消丸則元氣不損惡露可消

加味補中益氣湯

此方治[illegible]

人參一錢 白朮二錢 當歸三錢 黃芪炙一錢

白芍一錢炒 廣皮四分 甘草四分

薑棗煎服

三消丸 治婦人死血食積痰三等症

黃連一兩 一半用吳萸煎汁去渣浸炒 一半用益智仁炒去益智仁不用

萊菔子一兩五錢炒 川芎五錢 桃仁二十粒 山梔

青皮 三稜 莪朮 各五錢俱用醋炒 山查一兩

香附一兩童便浸炒

右爲末蒸餅爲丸食遠服用補中益氣湯送下五六十丸或用白朮三錢陳皮五錢水一鍾煎五分送下亦可

乳癥第四十一

乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若乳房臃腫結核色紅數日外腫痛潰稠膿膿盡而愈此屬胆胃熱毒氣血壅滯名曰乳癰易治若初起內結小核不紅不腫不痛積之歲月漸大如巉巖山破如熟榴難治治法痛腫寒熱宜發表散邪痛甚宜疏肝清胃膿成不潰用托裏肌肉不生膿水清稀宜補脾胃膿出及潰惡寒發熱宜補血氣飲食不進或作嘔吐宜補胃氣乳岩初起用益氣養榮湯加歸脾湯間可內消若用行氣補血之劑速亡甚矣

瓜蔞散 治一切癰疽並治乳癰癰者六腑不和之氣陽滯於陰則生之

瓜蔞一個 連皮搗爛　生甘草五分　當歸三錢

乳香五分 燈心炒　沒藥五分 燈心炒　金銀花三錢　白芷一錢

一本大黄作三錢有人參三錢

一本人參[illegible]味各二

青皮五分 水煎溫服

回脉散 從乳癰未潰時服此毒從大便出虚人不用

大黄三錢半 白芷八分 乳香五分 木香五分

没藥五分 穿山甲五分蛤粉拌炒

右末 人參三錢煎湯調藥末服

十全大補湯 [illegible]

人參 白术 黄芪 熟地各三錢 茯苓八分

甘草五分 川芎八分 金銀花三錢

潰刖黄連肉果瀉加麥冬五味寒熱往來用馬蹄香

搗散凡乳癰服薏苡仁粥好

又方用烏藥軟白香辣者五錢研水一碗牛皮膠一

片同煎七分溫服如孕婦腹内癰此二方可通用

又有乳吹乃小兒飲乳口氣所吹乳汁不通壅結作痛不急治則成癰宜速服瓜蔞散更以手揉散之

風甚第四十二

用山羊血取色新者於新瓦上焙乾研末老酒冲下五六分為度重者用至八分其效如神

又用抱不出殼雞子瓦上焙乾酒調服

如治虛寒危症用藍蘈子根刮皮新瓦上焙乾研末溫服一錢為度雖危可保萬全

不語第四十三

乃惡血停蓄於心故心氣閉塞舌強不語用七珍散

人參　石菖蒲　川芎　生地各一兩

辰砂研五分　防風五錢　細辛一錢

其爲細末用薄荷湯下一錢因痰氣鬱結閉口不語者用好明礬一錢水飛過沸湯送下

一方治產後不語

人參　石蓮子去心　石菖蒲各等分　水煎服

婦人良方云產後猪心腎虛不能發聲七珍散脾氣鬱結歸脾湯脾傷食少四君子湯氣血俱虛八珍湯不應獨參湯更不宜急加附子蓋補其血以生血若單用佛手散等破血藥誤矣

產後編下 終

補集

產後大便不通用生化湯內減黑薑加麻仁脹滿加陳皮血塊痛加肉桂元胡如燥結十日以上肛門必有燥

糞用蜜棗導之

煉蜜棗法

用好蜜二三兩火煉滚至茶褐色先用涇桌傾蜜在桌上用手作如棗樣極肛門待欲大便去蜜棗方便

又方用麻油口含竹管入肛門內吹油四五口腹內糞和即通或豬胆亦可

治產後雞爪風

桑柴灰三錢存性　魚膠炒三錢　手指甲炒十二個

共爲末黃酒送下取汗即愈

保產無憂散

當歸酒洗錢半　川芎錢半　炒黑芥穗八分　艾葉炒七分

麵炒枳殼六分　炙黃芪八分　兎絲子錢兩分酒炒

羌活五分 厚樸薑七分炒 川貝母去心一錢 白芍酒炒一錢二分
甘草五分 薑三片溫服
右方保胎每月三五服臨產熱服催生如神
治遍體浮腫是脾虛水溢之過凡浮腫者可通用俱神效
真縮砂仁四兩 萊菔子二兩四錢 研末水浸濃取汁浸砂仁候汁盡晒乾研極細末每服一錢漸加至二錢為度淡薑湯送下

保產神效方

未產能安臨產能催偶傷胎氣腰疼腹痛甚至見紅不止勢欲小產危急之際一服即愈再服全安臨產時交骨不開橫生逆下或子死腹中命在垂危服之

奇效

全當歸一錢五分酒洗　真川芎一錢五分　紫厚樸七分薑十炒

菟絲子一錢五分酒包　川貝母二錢去心淨煎好方和入

枳殼六分麵炒　川羌活六分　荊芥穗八分

黃芪八分蜜炙　蘄艾五分醋炒　炙草五分　白芍一錢二分冬用一錢酒炒

生薑三片水二鍾煎八分渣水一鍾煎六分產前空心預服二劑臨產隨時熱服

此乃仙傳奇方慎勿以庸醫輕加減其分兩

按保產無憂散保產神效方與編首治產秘驗良方俱相同特引論畧別並存參看可也






2册
4.50—